

Decon.

1962  
18

1962 18  
N<sup>o</sup>. 13.

Preis-Courant

VON

J. Geitner's

Treibegärtnerei

zu

Planitz bei Zwickau

in

Sachsen.

Auf das Jahr

1855.

Durch diesen Haupt-Preis-Courant erlöschen alle früheren, besonders aber deshalb, weil die Sortimentspflanzen, welche Nummern tragen, durchweg revidirt wurden.

Die Preise sind in Preuss. Courant 1 Thlr. = 30 Ngr., 4 Thlr. = 7 fl. bayr., Gold nach Cours. Beträge unter 10 Thlr. avancire ich durch die Post. Ueber 3 Monat nach Absendung noch ungetilgte Posten, verfüge ich durch Wechsel. Aufträge von unbekannten Bestellern bleiben, ohne beigefügten Betrag (oder Remesse auf gute Häuser und Plätze) stets unberücksichtigt. Aufträge und Geldsendungen werden franco erbeten; ebenso deutliche Namensunterschrift.

Der Transport der Waaren geschieht stets und ohne Ausnahme auf Kosten und Gefahr der Empfänger. Colli's unter 40 Pfd. werden der Post, darüber der Eisenbahn direct (also ohne Vermittelung eines Speditours) zur Beförderung als Eilgut übergeben. Von besonderer Wichtigkeit ist die Angabe der dem Bestimmungsorte zunächst gelegenen Bahnstation, und da, wo eine Spediteur-Vermittelung nothwendig oder gewünscht wird, Aufgabe einer betreffenden Firma.

Da ich den Schwindel verschmähe, Pflanzen meinen Preis-Courants einzuverleihen, die ich nicht selbst besitze, so können im Frühjahr und später eingehende Aufträge sofort und umgehend expedirt werden. Meine directen Verbindungen durch ganz Europa, setzen mich aber auch in den Stand, alle Pflanzen, die ich nicht besitze, sofort und ohne Preiserhöhung, auf deshalb zu erkeunten gegebene Wünsche zu verschaffen.

Durch zahlreiche Aufträge bitte ich mir Gelegenheit zu geben, sowohl meine strenge Solidität als auch das redliche Streben, allen Wünschen meiner geehrten Auftraggeber gerecht zu werden, thatsächlich zu bekunden.

In dieser Erwartung zeichne hochachtungsvoll

**G. Kettner.**

### *Einiges über die Behandlung frischangekommener Pflanzen.*

Oft sind lange Reisen, die theils durch grosse Entfernung, schlechte Verkehrsstrassen, unvorhergesehenen Aufenthalt bedungen, oder plötzlich eingetretene Kälte schuld, dass die schönsten Sendungen, wenn auch nur theilweise leiden.

Hierzu kommt aber auch noch die oft ganz verfehlte Behandlung nach der Ankunft. Die erste Bedingung, solche Sendungen zu erretten, ist: keip Luftzug, wenig Bod-nwärme, feuchte Atmosphäre, nothdürftiges Glessen, keine Sopan, doch hinlängliches Licht. Bei knolligen Pflanzen ohne, oder doch gewelktem Trieb und noch irgend feuchter Erde, darf anfangs gar nicht gegossen werden; durch die feuchte Luft müssen die Saugefässe erst wieder gehörig anschwellen, um die später in reicherm Maasse gewährte Nahrung verbrauchen zu können. Würden diese einfachen Rathschläge befolgt, wie manche gute Pflanze würde erhalten, wie mancher ungerechte und unverdiente Vorwurf unterbleiben,

### **Zeichen-Erklärung.**

- r Rankende Pflanzen.
- z Zwiebeln ( die man im Winter einziehen lassen kann.
- k Knollen (
- b Hatten sich ohne Decke ( im Freien.
- e „ „ unter „ (
- f Können im Sommer mit Vortheil in freien Grund gepflanzt werden.
- st Stauden.

Bei dem grossen und allgemeinen Verlangen nach schönen Blattpflanzen, an welchen meine Sammlungen so reich sind, hielt ich es für Pflicht, auf die besten besonders aufmerksam zu machen; gigantische Formen bezeichne ich mit \*, schöne und üppige mit †, so dass jeder Laie, ohne gekuscht zu werden, wählen kann. Auch versah ich die hervorragenden Pflanzen mit besonderen Bemerkungen, die dem Raume angemessen nur kurz sein konnten. Viele sind zu bekannt, andere noch nicht genug erprobt, um sie damit zu versehen. Ich erbielte mich aber auch darüber, wie über Culturen, als auch über die, durch höhere Preise bezeichneten grösseren Exemplare die ausführlichsten Erklärungen meinen geehrten Correspondenten zugehen zu lassen.

**Die geneigten Aufträge erbitte auf ein besonderes Blatt.**

## Warmhauspflanzen.

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
<i>Achyranthes porrigens</i> Jacq. —	5	<i>Alloplectus sparsiflorus</i> Mart. . —	5
— <i>sanguinolenta</i> Crantz		† — <i>speciosus</i> Hook. (stark) —	10
( <i>Aerva sanguinolenta</i> Blume) —	5	<i>Alpinia nutans</i> Rosc. . f $\frac{1}{2}$ —	2
<i>Adamia versicolor</i> Fortune —	10	<i>Amaryllis acuminata</i> Ker. z —	10
Schöner Blattschmuck und so frühes		— <i>carnea</i> . . . . z	1
als dankbares Blühen empfehlen diese Pflanze.		— <i>Carolinae</i> H. Monac.	
† <i>Adhatoda aenea</i> (Gendarussa) —	10	et <i>Nymph.</i> (= <i>striat-</i>	
Ist eine von den kleineren, doch netten		<i>tifolia</i> Sweet) . . z	1
bunten Blattpflanzen.		Ausser dem reizenden Blumenschmuck, der	
<i>Aeschynanthus atrosanguineus</i>		allen <i>Amarylliden</i> eigen, zieren sie die schö-	
Hort. (discolor Moore) . —	10	nen, dunkelgrünen Blätter mit einem blend-	
— <i>Boschianus</i> de Vriese —	5	end weissen Mittelstreifen.	
— <i>Devonianus</i> Hort. . —	10	— <i>Johnsonii</i> Lindl. z —	
— <i>grandiflorus</i> Spr. (pa-		— <i>Lehmanni</i> H. W. . z —	10
<i>rasiticus</i> Roxb.) . . —	5	— <i>leonensis</i> Ch. Lem. z —	10
— <i>Horsfieldii</i> R. Br. . . —	5	— <i>longifolia</i> L. . . z —	20
— <i>hybr. splendidus</i> . . —	10	— <i>nivea</i> Schult. . . z	1
— <i>javanicus</i> Hook. . . —	8	— <i>parviflora</i> . . . z	1
— <i>Lobbianus</i> Hook. . . —	5	— <i>purpurea</i> Ait. . . z —	10
— <i>longiflorus</i> Blume . . —	8	— <i>reticulata</i> L'Her. . z —	10
— <i>maculatus</i> Lindl. . —	10	— <i>revoluta</i> Ait. . . z	1
— <i>Paxtoni</i> Hort. . . . —	8	— <i>solandriiflora</i> Lindl.	
— <i>pulcher</i> . D. C. . . . —	5	( <i>Hippeastrum</i> Herb.) z 1-1 $\frac{1}{2}$ —	
— <i>Roxburghii</i> Wall. . . —	5	— <i>vittata</i> Ait. . . . z —	15
— <i>zebrinus</i> Hort. (mar-		<i>Anemioopsis californica</i> Hook. —	10
<i>moratus</i> Moore . . . —	5	<i>Angelonia Gardneri</i> Hook. f —	5
Sämmtliche <i>Aeschynanthus</i> in Moos ge-		Geruch der Blätter, den schönsten Aepfein	
pflanzt, werden oft und schön blühen.		gleich.	
<i>Allamanda cathartica</i> L. . . f —	15	<i>Anguria Makoyana</i> Ch. Lem. f —	8
Wuchernd im freien Grunde des Warmhau-		— <i>Warszewiczii</i> Ch. L. f —	10
ses erfreut sie durch ihre Pracht. Auch im Topf		<i>Aphelandra grandis</i> Klotzsch —	15
gezogen, erfreut sie durch ihre schönen, gros-		† — <i>squarrosa</i> N. E. var.	
sen, kanariengelben Blumen.		<i>Leopoldii</i> Car. Legr. 2 —	
— <i>verticillata</i> . Desf. . . —	15	Ganz abgesehen von ihrer prachtvollen	
<i>Aletris cochinchinensis</i> Lour. —	10	gelben Blütenrispe, empfiehlt sie sich durch	
• — <i>fragrans</i> Jacq. ( <i>Dra-</i>		ihre regelmässig und rein weissen Striche	
<i>caena</i> ) . . . . . 1 —	15	auf schönem grünen Grund der Blätter.	
Schon als kleine Pflanze der schönste		<i>Aralia arborea</i> L. . . . . —	
Schmuck des Zimmers, in welchem sie sich		— <i>capitata</i> Jacq. . . . . 1 —	
selbst fern vom Licht gut conservirt.		— <i>quinduensis</i> H. B. K. —	
<i>Alloplectus dichrous</i> D. C. . —	5	<i>Arctocalyx Endlicherianus</i> FzI. —	20
— <i>Pinellianus</i> Ch. Lem. —	5	<i>Ardisia crenulata</i> Vent. . . . —	5
† — <i>Schlimmii</i> Planch. et		— <i>fructu albo</i> . . . . . 15	
Lind. . . . . —	20	Beide <i>Ardisien</i> gewähren, bedeckt mit	
Originelle Blumen, Blätter deren Rückseite		weissen oder rothen Früchten, einen herr-	
selbst schön ist.		lichen Anblick.	

	Thlr. Ngr.
<i>Argyria argentea</i> A. Choisy. <b>r</b> — 7	
Schon geformtes Blatt, mit silberweisser Rückseite.	
— <i>Choisyana</i> J. Makoy	
Cat. . . . .	1 —
<i>Aristolochia gigas</i> Hartw. et	
Sk. . . . .	<b>r</b> — 5
— <i>hians</i> W. . . . .	<b>r</b> — 10
— <i>Kaempferii</i> W. . . . .	<b>r</b> — 15
— <i>picta</i> Karst. . . . .	<b>r</b> — 10
— <i>saccata</i> Wall. . . . .	<b>r</b> — 10
— <i>trilobata</i> L. . . . .	<b>r</b> — 7
Diese Gattung zeichnet sich durch originelle Blütenformen aus.	
<i>Asclepias curassavica</i> L. . . . .	<b>f</b> — 5
† <i>Astrapaea mollis</i> Hort. . . . .	$\frac{1}{2}$ — 1 —
* — <i>Wallichii</i> Lindl. . . . .	1 — 10 —
Sehr stark.	
<i>Banisteria chrysophylla</i> Lam.	
( <i>Heteropteris</i> H. B. K.) <b>r</b> — 20	
<i>Barbacia purpurea</i> Hook. . . . .	15
— <i>Rogierii</i> Planch. . . . .	15
— <i>sanguinea</i> Hort. . . . .	15
<i>Barnadesia rosea</i> L. . . . .	10
<i>Besleria campanulata</i> Lindl. . . . .	5 — 10
<i>Bignonia Carolinae</i> Lindl. <b>r</b> — 5	
— <i>Chamberlayni</i> Sims. <b>r</b> — —	
— <i>grandiflora</i> Jacq. . . . .	<b>r</b> — 10
— <i>speciosa</i> Lindl. ( <i>picta</i> Hook.) . . . . .	<b>r</b> — 10
— <i>Tweedianae</i> Lindl. <b>r</b> — 10	
<i>Biophytum sensitivum</i> D. C. . . . .	15
<i>Boehmeria tenacissima</i> Blume . . . . .	10
— <i>urticaefolia</i> Spr. . . . .	10
* <i>Bonapartea juncea</i> Ruiz. et Pav. ( <i>Littaea geminiflora</i> Brign., <i>Agave</i> ) . . . . .	3 — 20 —
* <i>Brexia chrysophylla</i> Swt. . . . .	3 —
* — <i>madagascariensis</i> Ker. . . . .	1 15
* — <i>serrata</i> Lindl. . . . .	1 —
† <i>Brownea coccinea</i> Jacq. . . . .	3 —
† — <i>erecta</i> Hort. . . . .	10 —
Kaum gibt es etwas überraschenderes als diese Br. im jungen Triebe, wie er einem mattgelb schillernden Federstutz ähnlich, dem Herz entsteigt.	
† — <i>grandiceps</i> Jacq. . . . .	12 —
† — <i>latifolia</i> Jacq. . . . .	5 —
† — <i>princeps</i> . . . . .	12 —
<i>Brucelia violacea</i> (Phytolacca) — 5	
Reich belohnt sie die wenige Mühe ihrer einfachen Kultur mit fusslangem, rothem Blütenstiel, weissen Blüthchen und später fast schwarzen Beeren.	
<i>Brugmansia candida</i> Pers. <b>f</b> — 10	
— <i>floribunda</i> Paxt. ( <i>Juanullos aurantiaca</i> ) . . . . .	15

	Thlr. Ngr.
<i>Brunfelsia americana</i> L. . . . .	5
<i>Bryophyllum calycinum</i> Salisb. — 5	
Hochst merkwürdig durch ihre Knospenbildung aus den Blättern.	
<i>Buddleja Lindleyana</i> Fortune — 5	
— <i>quercifolia</i> . . . . .	5
<i>Buginvillea grandis</i> . . . . .	10
— <i>spectabilis</i> W. . . . .	10
— <i>splendens</i> . . . . .	10
<i>Burchellia capensis</i> R. Br. — 5-10	
† <i>Calathea flavescentes</i> Lindl. — 10	
Die regelmässig fein gepressten Blätter verleihen der Pflanze ein eigenthümliches Ansehen.	
<i>Calonyction roseum</i> . . . . .	20
<i>Campylobotrys discolor</i> Ch. Lem. ( <i>Higginsia</i> Planch.) — 20	
<i>Capanea grandiflora</i> Desne. — 15	
<i>Centradenia floribunda</i> Planch. <b>f</b> — 5	
— <i>rosea</i> Lindl. . . . .	<b>f</b> — 5
<i>Centrosolenia monocotenia</i> Schldl. . . . .	1 —
<i>Cephalotus follicularis</i> La Bill. 10 —	
Diese kleine originelle Schlauchpflanze, legt mit gepressten und gefranzten Rändern, sowie mit bunten Deckeln versehene Schlauchrings auf den Topf. Gehört gleich den Sarracenien zu den Wundern der Schöpfung.	
<i>Ceropegia Cumingiana</i> Desne. <b>r</b> — 10	
— <i>elegans</i> Wall. . . . .	<b>r</b> — 10
Wer die eigenthümliche Färbung und den Bau der Stapelienblumen liebt, ohne deren widerlichen Geruch, der wähle sich <i>Ceropegien</i> .	
<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl. — 5	
— <i>laurifolium</i> L'Her. . . . .	5
— <i>pendulinum</i> Jacq. . . . .	5
— <i>roseum</i> H. B. K. . . . .	5
* <i>Charlwoodia congesta</i> Swt. 10 Ngr. — 8 —	
<i>Chirita sinensis</i> Lindl. . . . .	5
— <i>sinensis</i> fol. var. . . . .	5
— <i>Moonii</i> Hook. . . . .	10
— <i>Walkeriae</i> Hook. . . . .	10
<i>Chloranthus erectus</i> Wall. . . . .	5
<i>Chorysanthera atropurpurea</i> Desne. . . . .	10
<i>Chrysophyllum speciosum</i> ( <i>Vismia macrophylla</i> ) . . . . .	—
† <i>Cissus discolor</i> Blume <b>r</b> 5 N. — 1 —	
Diese von allen Gartenzeiten gerühmte Neuheit verdient das ihr gespendete Lob im höchsten Grade. Bei der Schnelligkeit des Wuchses vereinigt sie im Colorit der Blätter die grösstmögliche Zartheit tropischer Gebilde, und eignet sich auch zur gewöhnlichen Zimmerkultur.	
— <i>velutina</i> h. Belg. . . . .	<b>r</b> — 5
<i>Citharexylum quadrangulare</i> Jacq. . . . .	15

	Thlr. Ngr.
<i>Clerodendron calamitosum</i> L. . . . .	15
— <i>capitatum</i> Schuhm. . . . .	20
— <i>coccineum</i> Hort. . . . .	20
— <i>Devonianum</i> . . . . .	1
— <i>emirnaense</i> Hook. . . . .	5
— <i>fallax</i> Lindl. . . . .	1
— <i>foetidum</i> Bunge (Cl. Rungel Steud.) . . . . .	1-2
Bei einfacheren Blattformen ist es mehr die Blütenpracht, welche uns diese ganze Gattung unentbehrlich macht. Vorstehende Art, welche im schönsten Karmin prangt, verdient besonders auch darum unsere Aufmerksamkeit, da Versuche gelungen sind, sie bei kühler Temperatur zu cultiviren.	
— <i>fortunatum</i> L. . . . .	20
— <i>fragrans</i> W. . . . .	5
— <i>glaucum</i> Wall. . . . .	10
+ — <i>hastatum</i> Wall. . . . .	15
— <i>heterophyllum</i> R. Br. . . . .	5
— <i>Hügelii</i> Hort. belg. (= <i>splendens</i> Hügelii Makoy) . . . . .	15
— <i>Kaempferi</i> Siebold . . . . .	1
— <i>laevifolium</i> Blume . . . . .	10
— <i>paniculatum</i> L. . . . .	20
— <i>purpureum simplex</i> . . . . .	5
— <i>speciosissimum</i> Paxt. (squamatum Vahl.) r . . . . .	—
— <i>splendens</i> Knight . . . . .	15
— <i>tomentosum</i> R. Br. . . . .	10
— <i>villosum</i> Blume . . . . .	10
— <i>viscosum</i> Vent. . . . .	20
— <i>volubile</i> P. B. . . . .	10
<i>Clitoria ternatea</i> L. . . . .	r 15
Schlanker Wuchs und schönste blaue Blüten.	
<i>Clivia nobilis</i> Lindl. . . . .	20
+ <i>Coccoloba excoriata</i> L. . . . .	1
* — <i>pubescens</i> L. . . . .	—
<i>Codiaeum chrysostictum</i> Spr. ( <i>Croton pictum</i> Hook.) . . . . .	10
<i>Coleostylis aurantiaca</i> . . . . .	5
+ <i>Coleus Blumei</i> Benth. ( <i>Plectranthus versicolor</i> h. V. Houtte; Pl. <i>scutellarioides</i> Blume . . . . .	5
+ — <i>Mackeyi</i> Benth. . . . .	5
Beide der vorstehenden Pflanzen bilden mit ihren verschiedenfarbig gestreiften und gefleckten Blättern eine sehr belebende Zierde bei Decorationen.	
<i>Columnnea bimaculata</i> Warsz. . . . .	10
— <i>elegans</i> . . . . .	5
— <i>Schiedeana</i> Schidl. . . . .	10
— <i>splendens</i> Paxt. ( <i>Nematanthus Guillemia-</i>	

	Thlr. Ngr.
— <i>nus</i> Hort. belg. = C. grandiflora Hort.) . . . . .	10
<i>Columnnea zebrina</i> . . . . .	10
<i>Combretum argenteum</i> . . . . .	r 10
— <i>grandiflorum</i> G. Don. r . . . . .	7
<i>Convolvulus pentanthus</i> Jacq. r . . . . .	10
— <i>scaber</i> (Ipomaea) . . . . .	10
* <i>Cordylina Eschscholziana</i> Mart. ( <i>Calodracon terminalis</i> Planch.) . . . . .	1-3
— <i>heliconiaefolia</i> Otto et Dietr. ( <i>Calodracon</i> Planch.; <i>Dracaena brasiliensis</i> Hort.) . . . . .	1-10
* — <i>rubra</i> Hügel ( <i>Charlwoodia</i> Planch.) . . . . .	2
— <i>spectabilis</i> Kth. et Bché. ( <i>Charlwoodia</i> Planch.) . . . . .	1
— <i>vivipara</i> Hort. ( <i>Chlorophyllum Sternbergianum</i> Steud.) . . . . .	5
Zum decoriren unentbehrlich.	
<i>Costus speciosus</i> Sm. . . . .	k 15
* <i>Crinum amabile</i> Don. . . . .	2
* — <i>americanum</i> L. . . . .	1-2
* — <i>asiaticum</i> L. . . . .	1
— <i>Broussonetianum</i> Sw. z . . . . .	4
— <i>capense</i> Herb. . . . .	20
* — <i>caucasicum</i> ? . . . . .	1
— <i>Commelyni</i> Jacq. z . . . . .	1-2
— <i>deflexum</i> Ker. . . . .	1
— <i>erubescens</i> Ait. . . . .	2
— <i>giganteum</i> Andr. . . . .	1-2
— <i>scabrum</i> Sims. z . . . . .	20
Die höchsten Ansprüche, welche man an eine Pflanze machen kann, sind Blatterschmuck, Blütenreichthum und Schönheit, unbestreitbare Vorrechte der Crinum-Arten; ja sogar bei gewöhnlicher Zimmerkultur erfreuen sie jährlich durch ihre Mandelduft verbreitenden, grossen, weissen oder bunten Blumen.	
<i>Croton angustifolium</i> Hort. fol. pict. . . . .	15
— <i>penicillatum</i> Vent. . . . .	5
— <i>tomentosum</i> Hort. . . . .	5
* <i>Curculigo latifolia</i> Dryand. . . . .	10
— <i>recurvata</i> Dryand. . . . .	7
Bei Zimmerdecorationen schon ihrer Ausdauer wegen unentbehrlich.	
<i>Cyrtanthera magnifica</i> N. E. . . . .	10
— <i>Pohleana</i> . . . . .	10
* <i>Dasyliroton</i> sp. Texas . . . . .	1
<i>Dermatophyllum speciosum</i> Schöele . . . . .	1

- Thlr. Ngr.
- Desmodium gyrans* D. C. . . — 10  
 Vom frühen Morgen in steter Bewegung, sinken ermattet die Blätter und Blättchen am Abend in sich zusammen. — Ein Wunder der Schöpfung.
- † *Dianella australis* Hort. . . 8 —  
 Ganz ähnlich der *Bonaparteia*, doch sind die viel längeren Blätter in ihrer Haltung noch graziöser.
- *coerulea* Sims. . . — 20  
 — *longifolia* R. Br. . . — 20
- \* *Dichorisandra ovalifolia*  
 Presl . . . k — 20  
 — *ovata* Mart. . . k — 15  
 — *procera* Mart. . . k. r — 7  
 — sp. n. à feuilles rubandées de rouge (h. V. Houtte) . . . k 2 —  
 Durch Blätter und Blüten ein grosser Schmuck unserer Häuser.
- Dichromena pubera* Vahl. (Ampelpflanze) . . . — 5
- Dictyanthus campanulatus*  
 Rchb. (= D. Pavoni) . . — 10-20
- Dillivaria ilicifolia* Pers. . . — 20
- \* *Dionaea Muscipula* Ellis . 1-2 —  
 Wem wäre nicht dieser zierliche, wunderbar ausgerüstete Insectenfänger bekannt? Ein Wunder der Schöpfung! Zu grosser Wärme im Sommer zu wenig und im Winter zu viel Wasser: sind seine Hauptfeinde.
- Dioscorea alata* L. . . r — 10  
 — *discolor* Hort. (vera) rk — 10  
 Die nobel geformten Blätter beider, deren leichte Cultur und üppiger Wuchs, das bunte Colorit der letzteren lassen sie empfehlen.
- Dipladenia atropurpurea* A. D. C.  
 (Echites Lindl.) . r — 20  
 — *splendens* A. D. C.  
 (Echites Hook.) . r — —
- Dipteracanthus spectabilis*  
 Hook. . . r — 10  
 Blüht dankbar und schön.
- Dombeya Erythroxylon* W. . . — —  
*Dorstenia arifolia* Lam. . . — 15
- \* *Dracaena arborea* Lk. 10 Ngr. - 6 —  
 \* — *australis* Forst. (*Dracaenopsis* Planch.) . 1 —  
 \* — *cannaefolia* . . . 2 —  
 \* — *cernua* Jacq. (*Cordylina* Planch.) . . . — 20  
 \* — *Draco* L. (*yuccaeformis* Vand.) . . . 10 —  
 \* — *marginata* Lam. . . 1-5 —  
 \* — *mauritanica* Lam. . . 1 —  
 \* — *nigra* . . . — 20  
 — *nobilis* H. V. Houtte (*Calodracon* Planch.) 2 —
- Thlr. Ngr.
- \* *Dracaena reflexa* Lam. (*Cordylina* Planch.) . . — 15  
 \* — *selicifolia* Ait. . . — 10-20  
 \* — *Sieboldii* Planch. var. *maculata* (*Cordylina* Planch.) . . . 3 —  
 \* — *stricta* Sims. (*Charlwoodia* Swt.) . . . — 10  
 — *terminalis* Jacq. (*ferrea* L., *Calodracon* Jacquinii Planch.) . . . — 20  
 — *terminalis rosea* Jacq. (*ferrea versicolor*) 5 Ngr. - 2 Thlr.  
 \* — *umbraculifera* Jacq. . . — —  
 Nicht eine darf übergangen werden, denn wo sie die Natur durch Blattform ahnelte, da zog sie bunte Linien, oder malte Flecken, und verwechselte die Farben, so dass sie einander an Schönheit überbieten.
- Duranta Ellisia* L. . . . — 5  
 — *Plumierii* L. . . . — 5
- Echites difformis* Wall. . r — 10  
 \* — *melaleuca* H. Belg. r 10-20  
 — *nutans* Anders. k  $\frac{1}{2}$ -3 —  
 Die *Echites* zeichnen sich schon durch ihr schönes Blattcolorit aus, zumeist aber *E. nutans*, auf dessen dunkelgrünen Blättern der kleinste Nerv wie mit Blut getränkt durchscheint.
- *sinensis* Hort.? . r — 5
- Elaeocarpus cyaneus* Sims . . — 10
- Elettaria Cardamomum* (Amomum?) . . . . . — 10
- Embryopteris glutinifera* Roxb. — 20
- Episcea bicolor* Hook. . . — 10
- Eranthemum bicolor* Schrank f — 5  
 — *coccineum* Ch. L. . f — 5  
 — *leuconeuron* Hort. . . — 5  
 Mit Silbernetz umwebte und linirte Blätter, pulchellum blüht dankbar im Winter,  
 — *pulchellum* Andr. (= *Ruellia varians* Vent.) f — 5  
 — *strictum* Colebr. . f — 5  
 — *variabile* R. Br. . f — 5
- Eriocnema marmorea* Naud. (Bertolonia maculata D. C.) . . . . . 1 —  
 Kann mit Recht ein Seitenstück zu *Cissus discolor* genannt werden; der metallische Schimmer der bunten Blätter ist fast noch reicher.
- Eucharis candida* Planch. et Lindl. . . . . z 1-4 —  
 Rechtfertigt durch ihr Blühen die vielseitigen Anpreisungen.
- Euphorbia fulgens* Karw. (*jacquiniaeflora* Hort.) — 10  
 — *pulcherrima* W. . . — 10  
 — *splendens* Boj. . . — 10

	Thlr. Ngr.	Thlr. Ngr.	
Eurya latifolia Hort. . . . .	— 5	und sind deshalb der Liebling der Damenwelt. Hopeana ist aber der schönste Zimmerschmuck.	
† Ficus Afzelii G. Don. . . . .	1 —	Galphimia splendens H. Berol. — 5	
— aquatica W. . . . .	— 15	† Gardenia florida L. . . . .	— 5-10
— arbutifolia Lk. . . . .	— 10	— latifolia Ait. . . . .	— 15
† — australis W. . . . .	— $\frac{1}{3}$ -1	— radicans Thbg. . . . .	— 5
† — bengalensis L. . . . .	— 20	Veredelte Halbstämme . . . . .	— $\frac{1}{2}$ -1
— citrifolia Lam. . . . .	— 15	— Sherbourniae Hook. f. . . . .	— 10-20
— cuspidata Desf. . . . .	— 15	— Stanleyana Hook. . . . .	— $\frac{1}{2}$ -6
* — elastica Roxb. (Urostigma Miq. . . . .	— $\frac{1}{3}$ -20	— tetrasperma Roxb. . . . .	— 10
— elegans . . . . .	r — 10	— Thunbergii L. . . . .	— 15
— indica L. . . . .	— 10	— Whitfieldii Lindl. . . . .	— 1-2
— lucida Ait. . . . .	— 15	(malleifera Hook.) . . . . .	— 1-2
* — macrophylla Desf. . . . .	— 20	Kaum bedürfen sie der Empfehlung. Selbst bähnten sie sich den Weg bis zum eisigen Nordpol und zieren mit ihren dicht gefüllten, unschuldfarbigen, süß duftenden Blumen, zu jedem Feste die schöne Welt. Von G. radicans ziehe ich Halbstämme, die bedeckt mit Blumen ein wahrer Liebreiz sind.	
— — Roxb. (Roxburgii Hort. Artocarpus imperialis Hort.)	1-3 —	Geissomeria longiflora Lindl. — 5	
† — Martinicensis Hort. (et W. ?) Brosimum microcarpum ? Schott.) . . . . .	— $\frac{1}{2}$ -1	Gesneria discolor Lindl. (polyantha D. C.) . . . . .	k — 20
— maxima Mill. . . . .	— 15	— Gardneriana Hook. . . . .	— 10
* — Murrayana H. Berol. 1-3 —	— 1-3	— Geroldiana K. et B. k — 5	
— nymphaeaeifolia L. . . . .	— 4	† — Leopoldii Scheidw. k 1 5	
— quercifolia Lodd. . . . .	— 5-15	Wer liebt nicht die lebendig feurigen Blumen der Gesnerien. Die Krone von Allen ist unbestreitbar G. Leopoldii, die hier prächtig blühte.	
— religiosa L. . . . .	— 20	— macrostachya Ldl. k — 10	
* — rubiginosa Desf. . . . .	— 10	— magnifica Lond. k — 5	
— scabra Forst. . . . .	— 20	— mollis H. B. K. . . . .	k — 20
* — Schottii Hort. Berol. 1 —	— 1	— tubiflora Cav. . . . .	k — 5
— stipulata Thbg. (scandens Lam.) . . . . .	r — 10	Globba humilis . . . . .	— 10
* — subpanduraeformis Miq. ? (leonensis et sp. d'Afrique h. V. Houtte) 1-10 —	— 1-10	Griffonia hyacinthina Herb. z — —	
† — tomentosa Roxb. (barbata Wall.) . . . . .	r — 10	Haemanthus albidus Jacq. z — 5	
— venosa Ait. . . . .	— 10	— coccineus L. . . . .	z 2 —
Die ganze Gattung verleiht durch ihre meist dunkelgrünen Blätter und grossen mannigfaltigsten Formen unseren Warmhäusern einen schönen Schmuck.		Hamelia chrysantha Sbr. . . . .	— 10
Flacourtia inermis Roxb. . . . .	— 10	Harrachia speciosa Jacq. . . . .	— 5
† Franciscea acuminata Pohl. — 10	— 10	Hebeclinium inanthum Hook. (Conoclinium D. C.) . . . . .	— 20
— confertiflora Pohl. (laurifolia) . . . . .	— 20	Heckera umbellata Kunth . . . . .	— 15
— elegans . . . . .	— 4	* Hedychium coccineum Sm. f $\frac{1}{3}$ -1 —	
— eximia Scheidw. . . . .	— 1	* — coronarium Koen. . . . .	— $\frac{1}{3}$ -1 —
— gracilis . . . . .	— 15	* — flavescens Carey. . . . .	— $\frac{1}{3}$ 1 —
— Hopeana Hook. (uniflora Pohl.) . . . . .	— 10	* — Gardnerianum Wall. f $\frac{1}{3}$ -1 —	
— hydrangeaeformis Pohl. 1 15	— 1 15	Schon als Decorationspflanzen sehr werthvoll, in der Blüthe besonders letzteres grossartig.	
— — fl. pallido — —	— —	Heintzia tigrina Karst. . . . .	— 20
— latifolia Pohl. . . . .	— 15	† Heliconia angustifolia Hook. $\frac{1}{3}$ -1 —	
Diese Gattung verdient der besonderen Erwähnung, denn ihre Blüthen, die an einer Pflanze oft in 3 Farben prangen, erfüllen unsere Häuser mit dem lieblichsten Duft.		— — Bihai Swt. . . . .	— 15
		— — brasiliensis Hook. . . . .	— 1 —
		— — buccinata Roxb. (Phrynium Hort.) . . . . .	— 15
		— — discolor H. Berol. . . . .	— 10

	Thlr. Ngr.
† <i>Heliconia psittacina</i> L. . . . .	10
† — <i>pulverulenta</i> Lindl. ( <i>farinosa</i> Raddi.) . . . . .	10
* <i>Heritiera macrophylla</i> H. Belg. (= <i>grandis</i> Fisch.) . . . . .	—
<i>Hernandia sonora</i> L. . . . .	3
<i>Herpestes procumbens</i> Spr. (H. Monniera H. B.) . . . . .	5
<i>Hexacentris coccinea</i> N. E. ( <i>Thunbergia</i> Hook.) <b>r</b> — 10	
— <i>mysorensis</i> Wight. <b>r</b> $\frac{3}{2}$ — 2	
— <i>jutea</i> Hort. . . . .	2 15
Wenn leichte Cultur, schlanker Wuchs, reichliches Blühen, grosse goldgelbe und purpurne Blumen eine Pflanze in sich ver- einigt, so ist sie, wie diese, gewiss der warmsten Empfehlung würdig. Die letztere, noch eine Neuheit, trägt grosse canarien- gelbe Blumen.	
<i>Hibiscus liliiflorus</i> Cav. (puni- ceus Hort.) . . . . .	10
— <i>immutabilis</i> Dehnh. <b>f</b> — 10	
— <i>Manihot</i> L. . . . .	5
— <i>mutabilis</i> L. . . . .	5
— <i>palmatus</i> Cav. . . . .	10
— <i>regius</i> V. Houltte . . . . .	10
— <i>Rosa sinensis</i> L. fl. . . . .	10
— <i>rubro</i> pl. . . . .	10
— <i>speciosus</i> Ait. . . . .	5-15
— <i>tricolor</i> du Japon h. Belg. . . . .	10
Die grossen, feurig leuchtenden und man- nigfaltig variirenden Blumen machten diese Gattung seit alter Zeit zu den Lieblingen der Pflanzenfreunde.	
<i>Higginsia elegans</i> Planch. ined. . . . .	10
<i>Hoya bella</i> Hook. . . . .	20
— <i>carnosa</i> R. Br. . . . .	5
— <i>Cunninghami</i> . . . . .	10
— <i>imperialis</i> Lindl. . . . .	1
— <i>mollis</i> . . . . .	10
— <i>pendula</i> W. et A. . . . .	10
— <i>picta</i> Sieb. . . . .	1
— <i>Pottsii</i> Troill. . . . .	10
— <i>rotundifolia</i> Sieb. . . . .	10
— <i>sp. Java</i> . . . . .	10
— <i>variegata</i> de Vriese <b>r</b> 2 15	
Als Zimmerpflanze ist der Gattung durch die alte <i>carnosa</i> der Weg gebahnt. Theils bunte Blätter, niedlichere oder gigantische Form der Blüten empfehlen die neueren Species.	
<i>Inga ferruginea</i> Planch. (su- perbiens Ch. Lem.) . . . . .	3
— <i>pulcherrima</i> Cervant. — 10	
Die feinsten Mimosa-Blättchen, mehr noch	

	Thlr. Ngr.
die hohe Grazie und Zartheit der Blumen, lassen sie jeder Sammlung werth sein.	
<i>Ipomoea bonariensis</i> Hook. <b>r</b> — 10	
— <i>bonariensis</i> fl. rubro <b>r</b> — 15	
— <i>grandiflora</i> L. . . . .	10
— <i>Learii</i> Paxt. . . . .	5
— <i>palmata</i> Forsk. . . . .	5
— <i>Sellowii</i> Penny . . . . .	5
— <i>tyrianthina</i> Lindl. <b>r</b> — 10	
Jede leere Wand, auch noch so gross, sonnig oder schattig — <i>Ipomoea</i> sind wür- dig, sie zu decken, und lohnen durch dichte Blätterfülle und reizende Blumen.	
<i>Isolepis praelongata</i> N. E. . . . .	5
— <i>prolifera</i> R. Br. (Am- pelpfl.) . . . . .	5
— <i>pygmaea</i> Kunth (Am- pelpfl.) . . . . .	5
<i>Isoloma hondensis</i> Desne. var. <i>Wagnerii</i> Regel. <b>k</b> — 15	
— <i>hybr. Decaisneana</i> . <b>k</b> 2 —	
— <i>pictum</i> Benth. (Ges- neria Hook.) . . . . .	10
Lebhaftfarbigen Gesnerien sehr ähnlich.	
<i>Ismene nutans</i> Herb. . . . .	15
<i>Ixora coccinea</i> L. ( <i>grandiflora</i> D. C.) . . . . .	5-10
Eine alte Lieblingspflanze, die wohl kaum weiterer Anpreisung bedarf.	
— <i>Griffithii</i> Hook. (hydran- geaeformis Hort.) . . . . .	1 10
<i>Jaquemontia violacea</i> Choisy. <b>r</b> — 15	
<i>Jacquinia mexicana</i> . . . . .	1
<i>Jasminum grandiflorum</i> L. . . . .	10
— <i>multiflorum</i> Roth. . . . .	10
— <i>Sambac</i> L. . . . .	10
— — fl. pleno . . . . .	10
— — fl. plenissimo . . . . .	10
— — <i>grand Due de</i> Toscane . . . . .	15-20
Der schönste dichtet gefüllte aller Jas- minen.	
<i>Jatropha panduraefolia</i> Andr. 1 15	
<i>Jonesia Asoca</i> Roxb. . . . .	—
<i>Justicia brasiliana</i> Roth. <b>f</b> — 5	
— <i>calycotricha</i> Lk. et O. . . . .	5
— <i>earnea</i> Lindl. . . . .	5
— <i>chrysostachys</i> Hort. <b>f</b> — 5	
— <i>elongata</i> Vahl. . . . .	5
— <i>Giesbrechtiana</i> Ch. Lem. (= <i>Sericographis</i> N. E. et <i>Cyrtanthera</i> Desne.) . . . . .	5
— <i>glabrata</i> Hort. . . . .	5
— <i>speciosa</i> Roxb. . . . .	5
— <i>violacea</i> Vahl. . . . .	5



	Thlr. Ngr.
<i>Iusticia Zebrina</i> H. Amstel. 1 —	
Noch selten! mit schönen bunten Blatt!	
<i>Caempferia Galanga</i> L. . . k — 10-20	
Zieht im Winter ein und hilft dadurch den knappen Platz lichten, erfreut aber im zeitigsten Frühling mit zarten, weiss, violett und rosa gezeichneten und lieblich duftenden Blumen; schmückt im Sommer durch ihre schönen, grossen, zartschattirten Hatter. Nach vor Augen gehaltenen Abbildungen der neuen <i>Maranta Warszewiczii</i> ahnelt sie dieser nicht nur, sondern stellt sich derselben würdig zur Seite.	
<i>Karstenia roseo-odora</i> . . . — —	
<i>Klugia Notoniana</i> D. C. (zeylanica) . . . . . — 15	
<i>Lacepedea insignis</i> H. B. . . — 15	
<i>Lantana aculeata</i> L. . . f — 5	
— <i>amethystina</i> Otto et Diet. . . . . f — 5	
— <i>crocea</i> Lk. . . . . f — 5	
— <i>gigantea</i> . . . . . f — 5	
— <i>multiflora erecta</i> Hort. f — 5	
— <i>scabrida</i> Ait. . . . . f — 5	
— <i>Sellowii</i> Lk. . . . . f — 5	
— <i>spectabilis</i> . . . . . f — 5	
— <i>trifoliata</i> L. . . . . f — 5	
— <i>variegata</i> Otto et Dietr. . . . . f — 5	
— <i>Youngii</i> Hort. . . . . f — 5	
Bilden im Sommer in grösseren Gruppen des freien Landes durch ihre grosse Farben-Nüancirung den schönsten Schmuck.	
<i>Lapageria rosea</i> Ruiz et Pav. (stark) . . . . . r 12-30 —	
Wenig lebende Exemplare dieser prachtvollen Schlingpflanze dürften in Europa sein.	
<i>Lasiandra petiolata</i> Grah. . . — 10	
† <i>Liebigia speciosa</i> D. C. (Tromsdorffia Bl.) . . . . . — 15	
Schöner Wuchs, verbunden mit brillantem Blütenreiz und leichte Cultur machten sie rasch zum allgemeinen Liebling.	
<i>Lomatophyllum macrum</i> Lk. . . — 15	
<i>Ludolphia glaucescens</i> W. (Arun-dinaria P. B.) . . . . . — 15	
<i>Malpighia coccifera</i> L. . . . . — 15	
<i>Mandevillea suaveolens</i> Hort. r — 10	
<i>Manettia bicolor</i> Lindl. . . r — 5	
Hängend in Ampeln, kletternd an Draht und Stäbchen. erfreut sie im Winter, wo keine ihrer Schwestern sich zeigt, durch ihre munteren, rothen und gelben Blumen.	
— <i>glabra</i> Schldl. . . . . r — 5	
— <i>latifolia</i> . . . . . r — 5	
— <i>uniflora</i> H. B. . . . . r — 5	
<i>Mantisia saltatoria</i> Roxb. k — 5	
Originelle Blumen machen sie der Cultur werth.	

	Thlr. Ngr.
* <i>Maranta albo-lineata</i> V. Houtte . . . . . 2 —	
† — <i>bicolor</i> Ker. . . . . — 5	
† — <i>eximia</i> V. Houtte . . . — 20	
† — <i>glumacea</i> V. Houtte . . . — 15	
† — <i>lutea</i> Jacq. . . . . 3 —	
* — <i>roseo-lineata</i> V. Houtte 3 —	
* — <i>sanguinea</i> Hort. (Phrynium Hook., Stromanthe Sond.) . . . . . $\frac{1}{2}$ -1 —	
† — <i>Sellowii</i> . . . . . — 5	
* — <i>vittata</i> V. Houtte (? Phrynium pumilum) . 1 —	
* — <i>zebrina</i> Sims. (Calathea Ldl.) . . . . . $\frac{1}{2}$ -1 —	
Albo- und roseo-lineata, vittata und zebrina gehören zu den Wundern der Blätterzeichnung und Schattirung, die übrigen sind ebenfalls ausgezeichnete Decorationspflanzen.	
<i>Medinilla magnifica</i> Lindl. . . — —	
<i>Melastoma coeruleum</i> Hort. (Pleroma) . . . . . 5	
— <i>reticulatum</i> Velloza — 5	
— <i>rubrum</i> Hort. . . . . 5	
Alle Melastomen zeigen eine seltene Grazie im Wuchse. Die hier bezeichnete erfreut aber besonders durch dankbares Blühen.	
<i>Methonica Leopoldii</i> Ch. L. em. (Gloriosa) . . . . . r 2 —	
— <i>virescens</i> Lindl. var. Plantii (Gloriosa Hort.) r 2 —	
Beide blühen eben so dankbar als prachtvoll.	
— <i>superba</i> Lam. (Gloriosa L) . . . . . r — 20	
<i>Mikania odorata</i> Leh m. (Thunbergia ? fastuosa Ch. L. em.) r — 5	
— <i>speciosa</i> . . . . . — 15	
Sind beide schon hinlänglich empfohlen.	
<i>Mimosa pudica</i> L. . . . . — 5	
Bekannt genug unter dem Namen: „Rühr mich nicht an“.	
<i>Mitscherlichia spectabilis</i> Kunth. 1 —	
<i>Morenia odorata</i> Lindl. . . r — 10	
<i>Moussonia elegans</i> Desne. . . — 5	
<i>Mussaenda Afzelii</i> Schum. V. Houtte . . . . . — 10	
† — <i>frondosa</i> L. . . . . — 10	
† — <i>macrophylla</i> Wall. . . . — 10	
Es kann wohl kaum etwas Ueberraschenderes geben, als eine blühende <i>Mussaenda</i> , die sich selbst erst von Blättern einen weissen Teppich breitet, um darüber ihre hochgelben Blumen zu präsentieren.	
<i>Myrosma cannaefolia</i> L. fil. . . — 15	
* — <i>comosa</i> Spr. ( <i>Maranta truncata</i> Hort.) . . . — 15	

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
<i>Naegelia Zebrina</i> Rgl. (Ges- neria Paxt.) . . .	k — 5	<i>Pereskia grandifolia</i> Haw. . .	— 10
— — <i>grandiflora</i> . . .	k — 5	— <i>longispina</i> Haw. . .	— 10
— — <i>splendens</i> . . .	k — 10	— <i>rosea</i> Hort. . .	— 10
<i>Napoleona imperialis</i> P. B. (Whitfieldii Hook) . . .	2-3 —	So leicht in der Cultur, so wenig Platz raubend und doch so köstlich rosa blühend, sind sie unentbehrlich.	
Wer das Glück hat, sie zur Blüthe zu bringen, wird staunen über Farbenpracht und Bildung der Blumen.		<i>Pharus vittatus</i> Ch. Lem. . .	2 —
* <i>Nepenthes destillatoria</i> L. r 6-30 —		Wohl selten trifft man so eigenthümliche Form, im Einklange mit dem merkwürdigen bunten Colorit, welches dieser <i>Pharus</i> trägt.	
— <i>Rafflesiana</i> Jack. . .	— —	† <i>Phrynium setosum</i> Roxb. . .	5 —
<i>Ophioxylon album</i> H. Bogor. — 10		— <i>leptostachyum</i> . . .	15 —
† <i>Panax fruticosum</i> L. . .	1-1 —	<i>Phyllanthus latifolius</i> Swt. . .	10 —
† <i>Pancratium amboinense</i> L. z 5 —		<i>Physianthus albens</i> Mart. (Arauja Don.) . . .	r — 10
† — <i>caribaeum</i> L. (specio- sum) . . .	1 —	<i>Pilea serpyllifolia</i> Lindl. . .	5 —
† — <i>mexicanum</i> Hort. . .	5 —	Überall vorlieb nehmend, fesselt sie trotz ihres bescheidenen Aussehens doch die Auf- merksamkeit Aller, die sich Mühe nehmen wollen, ihr einzelne Knospen abzukneipen oder die ganze Pflanze mit lauem Wasser zu besprengen; die ersten werden in der hohlen Hand zerspringen und ein Kreuz for- miren, und die letzteren werden Stunden lang explodiren, so dass kleine Staubwöl- ken nach allen Richtungen aufsteigen.	
† — <i>odoratissimum</i> . . .	2 —	<i>Pincenecticia glauca</i> Hort. Belg. . . . .	20 —
<i>Panicum plicatum</i> Lam. . .	5 —	<i>Piper discolorum</i> Swt. . .	10 —
<i>Pardanthus chinensis</i> Ker. . .	5 —	— <i>nervosum</i> . . .	5 —
<i>Passiflora Actinia</i> Hook. . .	r — 10	<i>Pleroma Benthianum</i> Lindl. — 5	
— <i>alata</i> Ait. . . .	r — 10	<i>Plumbago capensis</i> Thbg. f — 5	
— <i>amabilis</i> Ch. Lem. r — 10		— <i>coerulea</i> H. B. K. f — 5	
— <i>amatissima</i> . . .	f r — 5-15	— <i>rosea</i> L. . . . .	f — 5
— <i>angustifolia</i> Swt. . .	r — 10	Besonders dankbar im freien Lande, P. <i>rosea</i> ist aber überaus zart, und blüht im Winter reizend.	
— <i>coerulea</i> L. . . .	f r — 10	<i>Polymnia Uvedalia</i> L. . .	f — 10
— <i>Colvillii</i> Swt. . . .	r — 10	<i>Portlandia grandiflora</i> L. . .	— 10
— <i>edulis</i> Sab. . . .	r — 7	<i>Quisqualis indica</i> L. . .	r — 5-20
— <i>Decaisneana</i> Goutier r — 20		Mit ihrem schönen Laub vermag sie ganze Häuser zu umranken. Die sich wohl drei- mal verfärbenden Blumen üben einen eigen- thümlichen Reiz.	
— <i>holosericea</i> L. . . .	r — 10	— <i>sinensis</i> Lindl. . .	r — 15
— <i>kermesina</i> L. et Otto r — 10		<i>Rhexia elegans</i> Hort. (Hetero- centrum) . . . . .	5 —
— <i>Loudoni</i> Atkins . .	r — 10	* <i>Rhopala corcovadensis</i> De Jonghe . . . . .	— —
— <i>Loweii</i> Heer. . . .	r — 10	<i>Rhytidophyllum floribundum</i> Ch. Lem. . . . .	10 —
— <i>Mayana</i> Loud. . .	f r — 10	<i>Rhytiglossa cristata</i> Rgl. (Por- phyrocoma cristata Hort.) — 10	
— <i>medusaea</i> Ch. Lem. (Jorullensis H. B.) . .	r — 10	<i>Rivina brasiliensis</i> Nocca . .	5 —
— <i>Middletoniana</i> . .	r — 5	Das ganze Jahr mit scharlachfarbenen Bee- ren bedeckt.	
— <i>princeps</i> Lodd. . .	r — 10	<i>Rondeletia odoratissima</i> Hort. r — 20	
— <i>quadrangularis</i> L. .	r — 15	— <i>racemosa</i> L. . . .	r — 20
— <i>rubra</i> L. . . . .	r — 10		
— <i>serratifolia</i> L. . .	r — 10		
— <i>Skinneri</i> . . . .	r — 10		
<i>Pavetta indica</i> L. . . .	— 10		
<i>Peutarbaphia cubensis</i> Desne. — 10			
<i>Peperomia asarifolia</i> Schiede et Deppe . . . . .	— 10		
— <i>blanda</i> H. B. . . .	— 10		
— <i>decussata</i> . . . .	— 10		
— <i>magnoliaefolia</i> Dietr. ( <i>Piper Jacq.</i> ) . . . .	— 10		
— <i>incana</i> Dietr. . . .	— 10		
— <i>microphylla</i> H. B. . .	— 5		

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Rondeletia speciosa Lodd.	r — 15	Siphocampylus Warszewiczii Rgl.	— 10
— — major H. Belg.	r — 10	Blüthen meist dankbar und zierlich.	
Ruellia anisophylla Wall.	f — 5	Solandra laevis Hook.	— 10
— azurea Hort. (=Hemigraphis elegans N. E.)	f — 5	Colossale, langgeröhrte, oben gefranzte, in der Hauptfarbe weisse Blumen sind eine köstliche Zierde dieser riesigen Pflanze.	
— Dicksoni H. Cels.	f — 5	Solanum amazonicum Ker.	f — 10
— flava Juss.	f — 5	— betaceum Cav.	f — 10
— formosa Andr.	f — 5	— fraudulentum Hort.	f — 20
— glomerata Wall.	f — 5	— purpureum Hort.	
— lactea Cav.	f — 5	Amst.	f 1 —
— lobata	f — 5	— quitense H. B. K.	f — 10
— maculata	f — 5	— sp. e Mexico	f — 15
— salicifolia Vahl.	f — 5	Zeichnen sich besonders durch reiche u. abwechselnde Blattform aus.	
Russelia juncea Zuccar.	f — 5-10	Sophora texana	— —
— multiflora Sims.	f — 5-10	*Spathodea campanulata Pal.	
— sarmentosa Jacq. (ver-		Beauv.	3 —
ticillata H. B. K.)	f — 5-10	* — gigantea Blume	3 —
Bel richtiger Cultur, d. h. im Sommer im Freien in sonniger Lage, erfreuen sie mit zahlreichen dunkelrothen Blüthen.		Sphaeralcea nutans Ch. Lem.	— 15
Salpicantha coccinea Hook.	— 5	Spironema fragrans Lindl.	— 5-10
Sansevieria fulvo-cincta Haw.	— 5	Stapelia rufa Mass.	— 5
— guineensis W.	1 —	— variegata Curt.	— 5
Saurauja setosa Hort.	1 —	Stenotaphron glabrum Trin.	
— spectabilis Hook.	1 —	(Ampelpflanze.)	r — 5
— villosa Hort. Belg.	1 —	Stephanotis floribunda Pet. Th.	r — 15
Sarracenia adunca Sm. (vario-		Stiffia chrysantha Mik. (insig-	
laris Mchx.)	3 —	nis Fisch.)	1-1 —
— Drummondii Crom.	7 —	Kraftig im Wuchse, gleicht sie während der Blüthe im Kleinen einer sich entladenden Bombe, aus deren dichten Feuerstrahlen die dicht gedrängten, langen hochrothen Blumen hervorbrechen.	
— flava L.	3 —	*Strelitzia Reginae Ait.	. . . 2-4 —
— purpurea L.	1-2 —	Streptocarpus Rhexii Lindl.	— 5
— rubra Walt.	4 15	Strobilanthes lactata Hook.	— 5
Sie treffend zu beschreiben, ist schwer. Ihre originellen Schläuche gleichen von oben antiken Urnen oder Humpen mit reicher Deckelverzierung; von der Seite gesehen aber Delphinen mit buntem Schlund. Jedem sind es Wunder der Schöpfung!!!		— Sabiniana Nees	— 5
Schubertia Kestersteinii Schldl.	r 2 —	Strophanthus dichotomus D. C.	— 10
Sciadocalyx Warszewiczii Rgl.	— 20	Tabernaemontana coronaria W.	
Scutellaria amoena	— 20	fl. pl.	— 10
— coccinea	— 5	Hat viel Aehnlichkeit mit Gardenien, nur ist sie viel zärtlicher.	
— splendens Lk. et Otto	— 5	Tacsonia Hellerii	. . . r — 15
— Ventenatii Hook.	— 5	— splendens Makay	r — 15
Sinningia Helleri N. E.	— 7	Testudinaria elephantipes	
Siphocampylus amoenus Planch.	— 10	Burch. (Tamus elephantipes	
— betulaeifolius Hook.	— 7	L'Her.)	. . . rk 5-15 —
— bicolor G. Don.	— 5	Die originell geformten Knollen haben manchen Unkundigen glauben gemacht, sie seien künstlich geschnitten.	
— canus Pohl	— 10	Tetranema mexicanum Benth.	
— longipes Cat. Linden.	— 10	(Pentstemon mexican. Hort.)	— 5
— microstomus Hook.	— 10	Theophrasta longifolia L. Jacq.	
— mollis Planch.	— 10	(Clavija ornata Don.)	— —
— nitidus Hort. (manet-		Thunbergia alata aurantiaca	
tisefflorus Hook.)	— 5	Hook.	. . . rf — 5
— reticulatus h. Belg.	— 20	Die erste und dritte lohnen im freien Grund durch dankbares Blühen. Die zweite bietet im Warmhaus einen reizenden Schmuck.	

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Thunbergia Chrysops Hook. <b>rf</b> — 5-10		Tradescantia velutina . . . <b>r</b> — 10	
— grandiflora Roxb. <b>rf</b> — 5-15		† — Warszewiczii Kth. et	
— ? havanensis Hort. <b>rf</b> — 5-15		Bch.é. . . . . —	
Thysacanthus rutilans N. E. . . — 20		— zebrina Lindl. (Zebrina	
Leichte Cultur, dankbares und prachtvolles		pendula Schnizl.) <b>r</b> — 5	
Blühen, rechtfertigen das grösste Lob. 1 Fuss		Der meist niedrige oder hängende Wuchs	
hoch, hängen die Blüthentrauben mit Massen		lässt sie als Einfassung der Beete empfehlen.	
2 Zoll langer Blumen vom schönsten Car-		Uhdea bipinnatifida Kth. (Po-	
min, fast auf den Topfrand.		lymnia grandis H. Berol.) <b>f</b> — 10	
Torenia asiatica L. . . . . — 5		Für Freilandgruppen der schönsten Schmück.	
Ob als Ampel-, Schling- oder Hochstamm-		Urtica bacicifera L. . . . . — 10	
pflanze gezogen, überall entfaltet sie ihren		— biloba Hort. . . . . — 5	
Reiz, am üppigsten aber, wenn sie mit dem		Urvillea ferruginea Lindl. <b>r</b> — 15	
Topfe im Wasser steht.		Van Houttea pardinata Desne. . . — 5	
— concolor . . . . . — 5		Veltheimia viridifolia Jacq.	
— elegans Hort. . . . . <b>r</b> — 5		(Alettris capensis L.) . . . <b>z</b> — 10	
Tradescantia coerulea . . . . . <b>r</b> — 5		Verbesina sinuata Ell. . . . . — 10	
— delicatula Hort. (Cali-		Vinca rosea L. . . . . — 5	
sia monandra Kth. var.		— — alba . . . . . — 5	
delicatula) . . . . . <b>r</b> — 5		Whitfieldia lateritia Hook. . . — 10	
† — discolor Sm. . . . . — 5-15		Yucca gloriosa L. . . . . $\frac{1}{2}$ — 4	
— fluminensis Arrab. <b>r</b> — 5		— longifolia Karw. . . . . —	
— picta . . . . . <b>r</b> — 10			
— fuscata Lodd. . . . . — 5-10			
— variegata . . . . . — 20			

## Warmhaus-Sortimentspflanzen.

### k. Achimenes.

(Im weitesten Sinne.)

Achimenes und Gloxinien sind die praktischsten Pflanzen unserer Warmhäuser. Im Winter eingezogen, nehmen sie mit den lichtlosesten, nur trocknen, frostfreien Plätzchen vorlieb; zum Frühjahr bedürfen sie nur eines angewärmten Kastens, um dann, ob kalt oder warm, uns mit dem herrlichsten Flor der Saison zu lohnen.

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
1. Scheeria mexicana Seem.		8. Tydaea ocellata Rgl.	
(Achimenes Chirita Van		(Achim ocellata Hook.) . . — 4	
Houtte, Ach. Scheerii		9. — picta Desne. (Achim.	
Hort. German.) . . . — 30		picta Benth.) . . . . — 5	
2. — ? sp. nov. h. Dresd. — 1		10. Trevirania coccinea W.	
3. Diastema gloxiniaeflora Rgl.		(Achimenes Pers.) — 1	
(Achim. gloxiniaefl. Forkel.) — 5-10		11. — grandiflora Schiede	
4. Guthnickia mimuliflora Rgl.		(Achimenes D. C.) . . — 2	
(A. atrosanguinea Hort.) — 1		12. — longiflora Rgl. (Achi-	
5. Locheria hirsuta Rgl.		menes D. C.) . . . — 2	
(Achimenes hirsuta. Lindl.) — 1			
6. — pedunculata Rgl.		Varietäten und Hybriden.	
(Achimenes pedunc. Benth.) — 1		à Stück 1 Ngr., 12 Stück 10 Ngr.	
7. Niphaea oblonga Lindl.		13. Trevirania amabilis. Rgl.	
(Achimenes alba Hort.) . . — 1		14. — A. Severi Rgl.	

- |   |   |
|---|---|
| 15. <i>Trevirania Baumanni fulgens</i> Rgl. | 47. <i>Trevirania longiflora candida</i> .          |
| 16. — — <i>hirsuta</i> Rgl.                 | 48. — — <i>ilicifolia</i> V. H.                     |
| 17. — — <i>lilacina</i> Rgl.                | 49. — — <i>latifolia</i> .                          |
| 18. — — <i>oculata</i> .                    | 50. — <i>Louis Van Houtte</i> Rgl.                  |
| 19. — <i>Bodmeri</i> Rgl.                   | 51. — <i>Mackoyi</i> Rgl.                           |
| 20. — <i>Böckmanni</i> Rgl.                 | 52. — <i>Major Füssli</i> Rgl.                      |
| 21. — — <i>coerulea</i> Rgl.                | 53. — <i>Mme. de Parpart</i> Rgl.                   |
| 22. — — <i>hirsuta</i> Rgl.                 | 54. — — <i>Rougement</i> Rgl.                       |
| 23. — <i>Boothii</i> Rgl.                   | 55. — — <i>Rendatler</i> Rgl.                       |
| 24. — — <i>variegata</i> Rgl.               | 56. — <i>Margareta</i> .                            |
| 25. — — <i>violacea</i> Rgl.                | 57. — <i>Napoleon Rossi</i> Rgl.                    |
| 26. — <i>Camiile Brozzoni</i> Rgl.          | 58. — <i>patens</i> Benth.                          |
| 27. — <i>Carl Wohlfahrt</i> Rgl.            | 59. — <i>picta</i> Rinzii.                          |
| 28. — <i>Caspar Schinz</i> Rgl.             | 60. — <i>pulchella</i> Rgl.                         |
| 29. — <i>coecinea excelsa</i> .             | 61. — <i>punctata</i> Rgl.                          |
| 30. — — <i>rosea Beatonii</i> Rgl.          | 62. — <i>purpureo-violacea</i> Rgl.                 |
| 31. — — — <i>formosa</i> Rgl.               | 63. — <i>sanguinea</i> Rgl.                         |
| 32. — — — <i>pulchella</i> .                | 64. — <i>Sir Treherne Thomas</i> Rgl.               |
| 33. — — <i>coelestina</i> Rgl.              | 65. — <i>Rendatlerii</i> Rgl.                       |
| 34. — — <i>cuprea</i> Rgl.                  | 66. — <i>Theodor Froebel</i> Rgl.                   |
| 35. — — <i>Escheri</i> Rgl.                 | 67. — <i>Wageneri</i> Rgl.                          |
| 36. — — — <i>angustifolia</i> Rgl.          | 68. <i>Locheria Ottonis</i> (hybrida?)              |
| 37. — <i>François Cardinaux</i> Rgl.        | 69. — <i>Skinneri grandifl.</i> (hybrida?)          |
| 38. — <i>Freund Moschkowitz</i> Rgl.        | 70. <i>Mandirola picturata</i> (Achi-               |
| 39. — — <i>Schwabe</i> Rgl.                 | menes.) . . . . . 1 15                              |
| 40. — <i>Geitneri Ranniger jr.</i>          | Die Blumen sind in Form der multiflora              |
| 41. — <i>Heerii</i> Rgl.                    | gleich, die Färbung ist eine ganz neue eigen-       |
| 42. — <i>Hillii</i> .                       | thümliche und wird allgemein gerühmt.               |
| 43. — <i>igneus</i> V. Houtte.              | 71. <i>Tydaea gigantea</i> (Aechmen.) 3 —           |
| 44. — <i>Liebmanni</i> Hort. Belg.          | Soll nach Abbildungen und Beschreibungen            |
| 45. — <i>lilacina</i> Rgl.                  | ein wahres Wunder unter den Aechme-                 |
| 46. — <i>longiflora alba</i> V. Houtte      | nes sein, nur der <i>picta</i> zu vergleichen, die- |
| ( <i>Jaureguia</i> Warsz.).                 | se aber an Grösse der Blumen und Blätter            |
|   | 2—3 Mal übertreffen.                                |

## Aroidae et Taccaceae.

Sämmtliche Aroideen blühen weniger schön als originell. Als Decórationspflanzen sind sie längst schon als die unentbehrlichsten erklärt, weshalb ich sie mit aller Sorgfalt sammelte; denn keine Familie bietet in Formen, — die meist von architektonischem Werth — diese Abwechslung. Ein grosser Theil hat Knollen und zieht im Winter ein, die übrigen haben ausser nobler Form das schönste dunkle Grün, und bieten, gleich den Ersteren, keine Schwierigkeit der Cultur.

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
<i>Acontias helleborifolius</i> Schott		<i>Anthurium digitatum</i> Schott,	
( <i>Arum</i> Jacq., <i>Caladium</i>		( <i>Pothos</i> Jacq.) . . .	1-5 —
<i>Vent.</i> ) . . . . . k	10	— <i>erythropodum</i> Miqu.	1 —
<i>Amorphophallus bulbifer</i> Bl.		— <i>Hookeri</i> Kth. ( <i>Pothos</i>	
( <i>Phytionium</i> Schott,		<i>aculis</i> Hort. Berol.)	1 —
<i>Arum</i> Roxb.) . . . k	1-1 —	— <i>lucidum</i> Kth. ( <i>Pothos</i>	
<i>Anthurium Beyrichianum</i> Kth.	1 10	<i>Hort. Berol.</i> ) . . .	15
— <i>caudatum</i> Kth. ( <i>Pothos</i>		— <i>Podophyllum</i> Kth. . .	1 15
<i>Hort.</i> ) . . . . .	20	— <i>trivernium</i> Kth. . .	25
— <i>cordifolium</i> Kth. ( <i>Po-</i>		— <i>violaceum</i> Schott var.	
<i>thos cordata</i> W. En.)	15	<i>latifolia.</i> ( <i>Pothos viola-</i>	
— <i>crassinervium</i> Schott,		<i>cea</i> Swt.) . . . . .	10
( <i>Pothos</i> Jacq.) . . .	2 —		

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
<i>Arisaema atrorubens</i> Bl. (Arum		<i>Dieffenbachia seguina</i> Schott	
Ait., Arum triphyllum		(Arum L. Caladium	
L.) . . . . .	k — 5	Vent.) . . . . .	10-20
<i>Arum italicum</i> Mill. . . . .	k — 7	— <i>β picta</i> . . . . .	½-5 —
— <i>orientale</i> M. B. . . . .	k — 7	<i>Dracontium cordatum</i> L. . . . .	15
— <i>pedatum</i> Fisch. . . . .	k — 15	<i>Dracunculus vulgaris</i> Schott	
— <i>pictum</i> L. . . . .	k ½-1 —	(Arum <i>Dracunculus</i> L.)	k — 10
<i>Ataccia cristata</i> Kth. (Ataccia		<i>Gonatanthus sarmentosus</i> Kl.	
<i>integrifolia</i> Presl		(Caladium Hort. Be-	
<i>Tacca cristata</i> Jack.		rol.) . . . . .	k 1 —
<i>Tacca Rafflesiana</i> Jack.)	8 —	<i>Houttuynia cordata</i> Thbg. . . . .	5
<i>Caladium arboreum</i> H. B. Kth.	1 10	<i>Macrogynne convallariaefolia</i> Lk.	
— <i>bicolor</i> Vent. (Arum		( <i>Aspidistra lurida</i> Ker.)	— 10
Ait.) . . . . .	k — 10-20	<i>Monstera cannaefolia</i> Schott	
— <i>β. haematostigmum</i> H.		Arum L. fil. <i>Pothos</i>	
Berol. . . . .	k — 10	Sims.) . . . . .	1-4 —
— <i>γ. pellucidum</i> D. C.		— <i>deliciosa</i> Liebm. (M.	
(Arum Fulcher) . . . . .	k — 25	Lennea C. Koch, <i>Philodendron</i>	
— <i>δ. picturatum</i> H. V.		<i>pertusum</i> Kth.	
Houtte. . . . .	k 1 —	et Bché.) . . . . .	1-5 —
— <i>η. splendens</i> H. V.		<i>Orontium japonicum</i> Thbg. . . . .	10
Houtte. . . . .	k — 20	— <i>fol. niv. marg.</i>	—
— <i>metallicum</i> H. V. H.		<i>Peliosanthes Teta</i> Andr. . . . .	15
(sp. de Borneo) . . . . .	k 1 —	<i>Philodendron cordatum</i> L. . . . .	10
— <i>odoratissimum</i> Hort. . . . .	1 —	— <i>crinipes</i> Ad. Brogn. . . . .	15
— <i>poecile</i> Schott . . . . .	k 1 10	— <i>erubescens</i> . . . . .	3 —
— <i>violaceum</i> Desf. . . . .	k 5 15 —	— <i>Fontanesii</i> Kth. (Caladium	
<i>Colocasia antiquorum</i> Schott		<i>brasiliense</i> Desf.)	2 —
(Arum <i>Colocasia</i> L.)	k 5-15 —	— <i>grandifolium</i> Schott.	
— <i>cochleata</i> Miq. . . . .	k 2 —	(Arum Jacq. Caladium	
— <i>cucullata</i> Schott.		W.) . . . . .	15
(Arum Lour. Caladium		— <i>Imbé</i> Schott (Caladium	
P.) . . . . .	k 2 —	H. Berol. <i>Colostigma</i>	
— <i>esculenta</i> Schott.		Schott.) . . . . .	2 —
(Arum L., Caladium		— <i>hastatum</i> . . . . .	3 —
Vent.) . . . . .	k 5-15 —	— <i>inciso-crenatum</i> Kth.	
— <i>indica</i> Kth. (Arum		( <i>lacinosum</i> Schott.)	2 —
Lour.) . . . . .	20	— <i>microphyllum</i> Hort.	
— <i>macrorrhiza</i> Schott,		( <i>Pothos cordatum</i> L.) . . . . .	10
(Arum L.) . . . . .	k — 10	— <i>pedatum</i> Kth. (Caladium	
— <i>nymphaeaeifolia</i> Kth.		Hook.) . . . . .	20
(Arum Roxb. Caladium		— <i>quinquenervium</i> Miq. . . . .	—
Vent.) . . . . .	k 1 —	<i>Pistia occidentalis</i> Blume	
— <i>odora</i> Schott, (Caladium		( <i>stratiotes</i> Hort., <i>Zala</i>	
Lour.) . . . . .	1 —	<i>asiatica</i> L.) . . . . .	5-10
— <i>ramosa</i> Schott, (Arum		<i>Plectogyne variegata</i> Lk. ( <i>Aspi-</i>	
Lk.) . . . . .	15	<i>distra elatior</i> Morr. et	
<i>Cryptocoryne spiralis</i> Fisch.		Dcsne. var. <i>striata</i> ) . . . . .	20
Arum Retz <i>Ambrosinia</i>		<i>Pothos lanceolata</i> L. . . . .	1 —
Roxb.) . . . . .	10	— <i>viridis</i> Parment. . . . .	—
<i>Cyrtospadix striatipes</i> C. Koch		<i>Remusatia vivipara</i> Schott	
( <i>Philodendron</i> Kth. et		(Arum Roxb., Caladium	
Bché.) . . . . .	—	N. E.) . . . . .	k — 5-10
<i>Dieffenbachia costata</i> Schott.	2 —		

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Richardia aethiopica Kth. (Calla L., Zantedeschia Spr.)	k — 5	Typhonium divaricatum Desne. (Arum L.)	k — 5
Scindapsus pinnatifidus Schott (Philodendron giganteum Hort. Belg.)	2 —	Xanthosoma edule Schott	k — 15
Solenostigma bicolor Kl.	— 15	— Masaffa	k 1 15
Syngonium auritum Schott (Arum L. Caladium Vent.)	— 10	— sagittifolia Schott (Arum L. Caladium Vent.)	k — 5-20
		— versicolor	k 1 15

## Begonia.

(Im weitesten Sinne.)

Die Mode erkor sich die Begonien zum Liebling. Sie verdienen es ihrer mannigfachen phantastischen Formen und niedlichen Blumen wegen unbedingt; daher bemühte ich mich, den Liebhabern ein möglichst reiches Sortiment zu bieten.

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
acuminata Dryand. (B. Hamiltoniana Lehm.)	— 5	fuchsoides Hook. (Titelbachia Kl.)	— 7
albo-coccinea Hook. (Mitscherlichia Kl.)	— 15	heracleifolia Cham. et Schldl. (Gireoudia Kl.)	— 10
argyrostigma Fisch. (B. maculata Rddi. Gaerdia maculata Kl.)	— 5	Hügelii	— 10
aucubaefolia Hort. Berol. (Knesebeckia Kl.)	— 10	hybrida Hort. Belg.	— 5
caroliniaefolia Regel (Gireoudia Kl.)	— 15	hydrocotylaefolia Grah. (Gireoudia Kl.)	— 5-10
castaneaefolia Otto et Dietr. (Titelbachia Kl.)	— 5	— Warszewiczii Hort. Berol.	— 5
cinnabarina Hook. (B. aurantiaca Hort.)	k — 20	ignea Hort. Berol. (biserrata Lindl.)	k — 15
conchaefolia Dietr. (B. scutellata Liebm., Gireoudia conchaefolia Kl.)	— 5	incarnata Lk. et Otto. (B. insignis Grah., Knesebeckia incarnata Kl.)	— 5
dichotoma Jacq. (Wageneria Kl.)	— 10	jatrophaefolia	— 20
dipotala Grah. (Haagea Kl.)	— 5	laevipes	— 7
Dirixii Hort. Belg. (B. hermanniaefolia Hort. non Hook.)	— 10	La Peyrousii Van Houtte (hybr.)	— 15
discolor R. Br. (Knesebeckia Kl.)	k — 5	macrophylla Dryand. (Gireoudia Kl.)	— 15
diversifolia Grah. (B. Martiana Lk. et Otto, Knesebeckia Martiana Kl.)	k — 5	madida	1 —
Dregei Otto et Dietr. (B. parvifolia Meyer, Augustia Dregei Kl.)	— 5	manicata Vis. (Gireoudia Kl.)	— 7
fagifolia Fisch. (Wageneria Kl.)	k — 7	— hybrida	— 10
Fischeri Otto et Dietr. (Pritzelia Kl.)	— 7	Meyeri Otto et Dietr. (B. eriocaulis Vis. Gurtia Meyeri Kl.)	— 10
		miniata Planch. et Lind. (Titelbachia Kl.)	— 15
		nigrescens Hort. belg.	— 10
		nitida Dryand.	— 5
		odorata W.	— 5
		opuliflora Putzeys	3 —
		Otonis Walp. (fuchsoides alba Hort.)	— 10

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
papillosa Grah. (Knesebeckia Kl.) . . . . .	— 7	semperflorans Lk. et Otto. . . . .	— 5
peltata Otto et Dietr. (Rachia Kl.) . . . . .	— 5	sinuata Grah. . . . .	— 5
phyllomaniaca Mart. (B. Moehringii Rgl., B. dipetala Warscewiczii Hort. Berol., Knesebeckia phyllomaniaca Kl.) . . . . .	— 15	spathulata Haw. (B. nervosa Desf., cucullata W.) . . . . .	— 5
platanifolia Schott. . . . .	— 10	sp. e Brasilia Hort. Berol. . . . .	— 7
Prestoniensis Moore (hybr.) . . . . .	— 10	stigmosa Lindl. (Gireoudia Kl.) . . . . .	— 8
princeps Hort. (Pritzelia Kl.) . . . . .	— 15	Thwaitesii Hook. (Reichenheimia Kl.) . . . . .	2 15
punctata Kl. (Gireoudia Kl.) . . . . .	— 5	tomentosa Schott (Wageneria Kl.) . . . . .	— 15
ramentacea Paxt. (B. organa Rgl., Pritzelia sarmentosa Kl.) . . . . .	— 6	undulata Hook. (Gaertdia Kl.) . . . . .	— 5
rhizocaulis . . . . .	— 20	urophylla . . . . .	2 —
ricinifolia Otto et Dietr. . . . .	— 15	vitifolia Schott (B. grandis Otto, Wageneria vitifolia Kl.) . . . . .	— 5
rubro-nervia . . . . .	— 15	xanthina Hook. . . . .	— 20
rubro-venia Hook. (Platycentrum Kl.) . . . . .	— 15	— gandavensis H. V. Houtte (hybr.) . . . . .	1 —
sanguinea Raddi (Pritzelia Kl.) . . . . .	— 10	— marmorea H.V. Houtte (hybr.) . . . . .	1 —
scandens Sw. (? Begonia scandens Aubl.) . . . . .	— 5	zebrina Hort. (Pritzelia Kl.) . . . . .	— 5
		— pallida . . . . .	— 5
		— splendens . . . . .	— 10

### Bromeliaceae.

Dankbares Blühen, und eine den meisten Arten eigene gefällige Form, sichern den Bromeliaceen überall ein Plätzchen in den Gewächshäusern. Besonders bemerkbar machen sich die Aechmea durch ihre herrlichen korallenartigen Blüthenähren, die Billbergia und Pitcairnia durch die verschiedenartigsten Farben der Blumen, als: roth, blau, violett, weiss, grün u. s. w., sowie die Pholidophyllum und Vriesea durch ihre mit bunten Querstreifen gezierten Blätter.

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Aechmea fulgens Brogn. . . . .	— 20	Bromelia Karatas L. . . . .	— 20
— miniata H. Makoy. . . . .	1 —	— nudicaulis L. . . . .	— —
Ananassa sativa nervosa maxima Hort. . . . .	1 —	— pumila Hort. . . . .	— 10
— — new Providence Lindl. (fructu maximo) . . . . .	1 —	— sp. e Brasilia . . . . .	— —
Billbergia acaulis Hort. belg. . . . .	— 10	Caraguata lingulata Lindl. . . . .	— —
— amoena Lindl. . . . .	— 10	Pholidophyllum zonatum Vis. (Tillandsia zonata var. viridis Hort.) . . . . .	— 10
— clavata Lindl. (Bromelia melaoantha Ker.) . . . . .	— 15	— — var. fuscum Vis. (Tillandsia zonata var. fusca Hort.) . . . . .	— 10
— discolor Hort. belg. . . . .	1 —	†Pitcairnia albucasfolia Schrd. . . . .	— 15
— farinosa Hort. . . . .	— 20	— angustifolia Ait. . . . .	— 15
— iridifolia Lindl. . . . .	— 5	— bromeliaefolia Ait. . . . .	— 15
— pyramidalis Lindl. . . . .	— 10	— cinnabarina A. Dietr. . . . .	— 10
— rhodocyanea Lem. . . . .	3 —	— fulgens Desne. . . . .	1 —
— vittata . . . . .	— 5	† — furfuracea Hook. . . . .	— 10-20
— zebrina Lindl. . . . .	— 20	— integrifolia Ker. . . . .	— 10
Bromelia bracteata Sodt. (Ananassa Ldl.) . . . . .	1 —	— Kegeliana Schldl. . . . .	— 15



	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
†Pitcairnia latifolia Ait. . . . .	10	Puya Altensteinii Otto et Dietr. . . . .	5-10
— muscosa Mart. Schult. (Puya leiocoma H. Petrop.) . . . . .	15	— aurantiaca H. Vindob. . . . .	20
— pruinosa H. B. . . . .	15	— longifolia H. Hafn. . . . .	10
— punicea Scheidwl. . . . .	10	— maidifolia Planch et Lind. . . . .	15
— ramosa Jacq. fil. . . . .	10	— undulata Ch. Lem. . . . .	1 10
— ringens Lk. Kl. Otto . . . . .	10	Tillandsia farinosa Hort. . . . .	1 —
— speciosa Hort. . . . .	10	— nana . . . . .	15
† — splendens H. Cels. . . . .	5	— nigra . . . . .	15
— suaveolens . . . . .	5	— Schüchii Beer et Fenzl. . . . .	10
— undulatifolia Hook. . . . .	15	Vriesea speciosa Hook. (Tillandsia splendens Ad. Brogn.) . . . . .	— —
Pourretia magnispatha . . . . .	—		
— sp. e Merida. . . . .	1		

## Filices et Lycopodiaceae.

Jeder weiss, dass man hier nicht nach Blütenfülle und Farbenschmelz suchen darf; dagegen stattete sie die Natur auf andere Weise durch Merkwürdigkeit und Reichthum der Formen aus, so dass sie von mikroskopischer Kleinheit, sich in den mannigfaltigsten, oft gigantischen Formen, bis zur Grösse und Pracht der majestätischen Palmen empor schwingen und mit jenen um den Preis vollendeter Schönheit kämpfen!!!

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Acrostichum flagelliferum Wall. . . . .	10	Aspidium uliginosum Kze. . . . .	10
— microlepis Kze. . . . .	20	Asplenium Belangeri Kze. . . . .	1 —
— peltatum Sw. . . . .	—	— bulbiferum Forst. . . . .	15
Adiantum aethiopicum L. . . . .	5-10	— caudatum Forst. . . . .	20
— brasiliense Lk. . . . .	10	— ebenum Ait. . . . .	10
— cuneatum Langsd. et Fisch. . . . .	5-10	— flabellifolium Cav. . . . .	10
— hispidulum Sw. R. Br. . . . .	15	— Nidus L. (Neottopterys vulgaris J. Sm.) . . . . .	2 —
— macrophyllum Sw. . . . .	20	— pinnatifidum Nutt. . . . .	10
— Moritzianum Lk. . . . .	7	— pumilum Sw. . . . .	7
— pedatum L. . . . .	15	Bathmum trifoliatum Presl. . . . .	15
— tenerum Sm. . . . .	5	Blechnum boreale Sm. (Lomaria Spicant Dsv.) . . . . .	5
Allosorus intramarginalis Presl. (Pteris Klfs.) . . . . .	10	— brasiliense Dsv. . . . .	5
— rotundifolium Kze. . . . .	10	— gracile Kaulf. . . . .	7
— sagittatus Presl. (Pteris Cav.) . . . . .	15	— lanceolatum Radd. . . . .	5
Alsophila caracasana Kl. . . . .	20-40	— occidentale L. . . . .	5
— Schöner Stamm. . . . .	—	Ceratopteris thalictroides Brogn. . . . .	10
— Humboldtii . . . . .	40	Cheilanthes amaurothachis Kze. . . . .	10
— Schöner Stamm. . . . .	—	— davallioides Lk. . . . .	10-15
— spec. . . . .	20	— micromera H. Berol. . . . .	10
— Schöner Stamm. . . . .	—	— repens Kaulf. . . . .	7
Aneimia Dregeana Kze. . . . .	10	— viscosa Klfs. . . . .	1 —
— Phyllitidis Sw. . . . .	7	Cibotium Schiedeii Schidl. . . . .	—
Aspidium augescens Lk. . . . .	1	Davallia pyxidata Cav. . . . .	15
— coriaceum Sw. . . . .	7	Dicksonia nitidula Kze. . . . .	5
— decursive-pinnatum Kze. . . . .	5	— rubiginosa Kaulf. . . . .	5
— falcatum Sw. . . . .	7	— tenera Presl. . . . .	10
— molle Sw. . . . .	5	Didymochlaena lunulata Desv. . . . .	2 15
— patens Sw. . . . .	7½		

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
<i>Diplazium celtidifolium</i> Kze. . . . .	2 —	<i>Polypodium morbillosum</i> Presl.	
— <i>giganteum</i> Karst. stark. . . . .	6 —	( <i>Drynaria coronans</i> ) . . . . .	6 —
— <i>Lasiopteris</i> Kze. . . . .	5 —	— <i>Paradiseae</i> Langsd. et	
— <i>pubescens</i> Lk. . . . .	1 —	Fisch. . . . .	10 —
<i>Doodia aspera</i> R. Br. . . . .	10 —	— <i>Phyllitidis</i> H. Berol. . . . .	10 —
— <i>media</i> R. Br. . . . .	6 —	— <i>repens</i> Sw. . . . .	10 —
— <i>rupestris</i> Kaulf. . . . .	5 —	— <i>vacillans</i> Lk. . . . .	7 —
<i>Goniophlebium metamorphum</i>		<i>Pteris arguta</i> Vahl. . . . .	10 —
Kze. . . . .	3 —	— <i>chrysocarpa</i> Lk. . . . .	10 —
— <i>Reinwardtii</i> de Vriese . . . . .	2 —	— <i>cretica</i> L. . . . .	10 —
( <i>Polypodium</i> Kze.)		— <i>flabellata</i> Thbg. . . . .	20 —
<i>Gymnogramme lanata</i> . . . . .	1 —	— <i>hastata</i> Sw. ( <i>Cheilan-</i>	
— <i>Linkiana</i> Kze. . . . .	10 —	thes Kze.) . . . . .	5 —
— <i>javanica</i> Bl. ( <i>variegata</i>		— <i>longifolia</i> L. . . . .	5 —
Miq.) . . . . .	—	— <i>mutilata</i> . . . . .	7 —
— <i>sulphurea</i> Dsv. . . . .	5 —	— <i>palmata</i> W. . . . .	10 —
— <i>tartarea</i> Dsv. . . . .	5-10 —	— <i>pedata</i> L. . . . .	15 —
— <i>tomentosa</i> Dsv. . . . .	15 —	— <i>serrulata</i> L. . . . .	7 —
— <i>villosa</i> Lk. . . . .	1 —	— <i>vespertilionis</i> La Bill. . . . .	10 —
<i>Hemionitis palmata</i> L. . . . .	15 —	<i>Selaginella</i> ( <i>Lycopodium</i> ) <i>apus</i>	
<i>Hemitelia horrida</i> R. Br. . . . .	5 —	Spring (L. brasili-	
— <i>integrifolia</i> . . . . .	20-50 —	ense Raddi) . . . . .	5 —
Schöne Stamme.		— <i>caesia arborea</i> Hort. $\frac{1}{2}$ -1 —	
<i>Lomaria Gilliesii</i> Hook. et		— <i>cordifolia</i> Spring ( <i>Lyc-</i>	
Grev. . . . .	10 —	opodium Dsv.) . . . . .	10 —
<i>Lygodium japonicum</i> Sw. . . . .	$\frac{1}{2}$ -1 —	— <i>cuspidata</i> Lk. (L. ta-	
<i>Marattia Kaulfussii</i> Kze. ( <i>Eu-</i>		mariscinum Lk. prius) . . . . .	5 —
<i>podium</i> J. Sm.) . . . . .	5 —	— <i>cuspidata</i> var. <i>elongata</i>	
<i>Microsorium irregulare</i> Lk. ( <i>Pol-</i>		(Sel. Avilae Kl.) . . . . .	15 —
<i>ypodium ireoides</i> Lam.) . . . . .	10 —	— <i>decomposita</i> Spring	
<i>Nephrolepis exaltata</i> Schott . . . . .	10 —	(Lyc. brasiliense Hort.	
— <i>pectinata</i> Schott. . . . .	15 —	Gall. et Belgic.) . . . . .	10 —
— <i>tuberosa</i> Presl. . . . .	15 —	— <i>denticulata</i> Lk. ( <i>Lycop-</i>	
<i>Nothochlaena nivea</i> Desv. . . . .	10 —	podium L.) . . . . .	5 —
<i>Osmunda palustris</i> Lk. . . . .	7 —	— <i>erythropus</i> Spring	
<i>Physematum obtusum</i> Kze. . . . .	10 —	(Lycop. umbrosum Ch.	
<i>Platyterium alaicorne</i> Dsv.		Lem.) . . . . .	10 —
( <i>Acrostichum</i> Swt., <i>Neu-</i>		— <i>Galeottii</i> Spring (suavis	
<i>roplatyceros</i> Fée) . . . . .	20 —	Kl., Schottii Hort.) . . . . .	5 —
— <i>grande</i> J. Sm. ( <i>Acro-</i>		— <i>inaequalifolia</i> Spring	
<i>stichum</i> A. Cunn., <i>Neu-</i>		( <i>Lycopodium</i> Hook. et	
<i>roplatyceros</i> Fée) . . . . .	10 —	Grev.) . . . . .	8 —
<i>Polypodium areolatum</i> W. . . . .	15 —	— <i>laevigata</i> Spring? ( <i>Lyc.</i>	
— <i>aureum</i> L. . . . .	10-15 —	<i>laevigatum</i> W. L. Will-	
— <i>Billardieri</i> R. Br. . . . .	6 —	denowii Dsv.) . . . . .	20 —
— <i>brevifolium</i> Lk. . . . .	15 —	— <i>lepidophylla</i> Spring? . . . . .	1 —
— <i>Cambricum</i> Dsv. . . . .	6 —	— <i>Martensii</i> Spring	
— <i>crenatum</i> Sw. . . . .	7 —	(Lyc. flabellatum Mart.	
— <i>cymatodes</i> Kze. . . . .	8 —	et Gal.) . . . . .	6 —
— <i>laetum</i> Raddi . . . . .	15 —	— <i>paradoxa</i> Hort. . . . .	1 —
— <i>latipes</i> Langsd. et		— <i>serpens</i> Spring (Lyc.	
Fisch. . . . .	15 —	<i>serpens</i> Desv.) . . . . .	15 —
— <i>longifolium</i> Presl. . . . .	10-15 —	— <i>sulcata</i> Spring ( <i>Lyc-</i>	
— <i>lycopodioides</i> L. . . . .	10 —	cop. stoloniferum Lk.) . . . . .	5 —

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Selaginella uncinata Spring		Selaginella viticulosa Kl. . .	— 10
(caesia Hort., Lyc. caesium Hort.) . . .	5	Woodwardia radicans Sw. . .	— 15

## K. Gloxinien.

(Im weitesten Sinne.)

Da sie schon jetzt auf keinem Blumentische mehr fehlen, so hat man höchstens den selten zu befriedigenden Liebhaber noch auf die neueste Vervollkommnung aufmerksam zu machen, dass die hier von 43—48 verzeichneten Sorten solche mit aufrechtstehenden Blumen sind.

à Stück 7 Ngr., à Dtzd. 2 Thlr.

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Gloxinia gesnerioides Ch. L.                    | 22. Madame de Sfaël V. Houtte.  |
| 2. — hirsuta Lindl.                                | 23. Mademoiselle de Sombreuil.  |
| 3. — maculata L'Her. (Salisia gloxiniaeflora Rgl.) | 24. Marie van Houtte V. Houtte. |
| 4. — suaveolens Dcsn. (Salisia Rgl.)               | 25. maxima.                     |
|  | 26. Menziesii coerulea.         |
|  | 27. monstrosa Lartey.           |
|  | 28. Napoleon V. Houtte.         |
|  | 29. P. G. Hoogeven.             |
|  | 30. Professor Pallador.         |
|  | 31. pulcherrima.                |
|  | 32. Richteri.                   |
|  | 33. rosea superba.              |
|  | 34. — grandiflora.              |
|  | 35. Saxonia.                    |
|  | 36. speciosa varietas.          |
|  | 37. — — macroph.                |
|  | 38. Stanleyana.                 |
|  | 39. Teichlerii.                 |
|  | 40. tricolor.]                  |
|  | 41. virginialis.                |
|  | 42. Wendlandii.                 |
|  | 43. adamas oculata Haake.       |
|  | 44. alba auriculata Haake.      |
|  | 45. Hauptmann Wuthe Haake.      |
|  | 46. Mars coerulea Haake.        |
|  | 47. Rex igneus Haake.           |
|  | 48. stellata Haake.             |

### Varietäten und Hybriden.

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 5. Bavaria.                     |  |
| 6. Cartonii Bot. Reg.           |  |
| 7. caulescens major Lindl.      |  |
| 8. — superba.                   |  |
| 9. Comtesse Clamm Galas Josst.  |  |
| 10. — Therese Thun Josst.       |  |
| 11. Dr. Gardner V. Houtte.      |  |
| 12. Duc d'Isly V. Houtte.       |  |
| 13. Frédéric Lenning V. Houtte. |  |
| 14. General Baudrand V. Houtte. |  |
| 15. Goodii.                     |  |
| 16. Graf v. Neipperg.           |  |
| 17. Herzog George.              |  |
| 18. Josstii.                    |  |
| 19. Madame Aglaë Adanson.       |  |
| 20. Lowii (Aledelli).           |  |
| 21. Madame de Genlis V. Houtte. |  |

mit  
auf-  
recht-  
stehen-  
den  
Blumen.

## Orchideen.

Die Orchideen bilden offenkundig den Gegensatz zu den Farnn, denn was ihnen, mit einziger Ausnahme der brillanten Anoechilus und Goodyera, die Natur an Blatterschmuck entzog, das ist in überraschendem Maasse auf deren Blüten gefallen, die nicht nur den Farbenreichtum und die Pracht der Schöpfung bekunden, sondern auch durch die verschiedensten Stellungen: bald hängend, bald emporsteigend, einzeln in gigantischer Grösse, oder zu Hunderten in langen Trauben imponiren; auch ausser dem Genusssinn noch dem Geiste reiche Nahrung durch ihre originellen tausendfaltigen Formen geben, die bald einem mit Beute beladenen Adler, bald den brillantesten Schmetterlingen und anderen Insecten gleichend, der Phantasie unendlichen Spielraum lassen, und einen bezaubernden geheimnissvollen Reiz auf jeden Beschauer ausüben. Fragen wir uns: warum finden wir sie noch so selten? so liegt die Antwort nicht fern. Man glaubt, ihre Cultur biete unübersteigliche Schwierigkeiten, es bedürfte besonderer Häuser u. dergl. mehr, was ich wohl für grössere Sammlungen, wie auch für einige Gattungen zugebe, aber keineswegs für die hier mit einem † bezeichneten, welche sich in jedem Warm-

häuschen leicht und dankbar cultiviren lassen. Nicht so leicht dürfte man überall eine passende Erde haben. Doch auch dem abzuholen, bin ich der Erste, welcher Versuche mit faserigem Torf machte, und die überraschendsten Resultate erzielte. Ich bin nicht nur bereit, meinen geehrten Correspondenten ausführliche Mittheilungen hierüber zu machen, sondern offerire denselben auch solchen Torf in Ziegelform circa 11 $\frac{1}{2}$  Zoll stark, à 100 excl. Emballage für 15 Ngr. Zerbröckelt und angefeuchtet dient er zu Topf- und Korb-Orchideen, die ihn begierig einstricken. Ganz gelassen ist er ein so guter Boden für Luft-Orchideen, dass viele derselben in kurzer Zeit die Wurzeln nicht nur anhängen, sondern sogar durch den Torf hindurchbohren! Wo hätten wir ein ähnliches Surrogat, wodurch die Cultur der oft zärtlichen Luft-Orchideen bedeutend erleichtert wird, wenn man nämlich weiss, wie wenig Baumrinde aller Art, ja selbst Kork, die Feuchtigkeit, als Haupthedingniss guten Gedeihens, aufhalten. Im vergangenen Jahr sagte ich: „Die Sache ist neu, aber ich hoffe, sie wird die Feuerprobe der Erfahrung aushalten.“ Heut kann ich hinzufügen: Torf bewährte sich so ausgezeichnet, dass im vorigen Jahre direct eingeführte O. — darauf gepflanzt, diess Jahr prachtvoll blühten, so dass jetzt meine ganzen Luft-O. auf Torf gepflanzt, oder vielmehr geheftet sind.

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
<i>Acanthophippium bicolor</i> Lindl. (Ceylon) . . . . .	— —	† <i>Bletia floribunda</i> R. Br. (West- indien) . . . . .	1 —
<i>Acineta Humboldtii</i> Lindl. (Venezuela) . . . . .	3 —	† — <i>hyacinthina</i> R. Br. (China) —	15
— <i>purpurea</i> Rchb. fil. (Venezuela) . . . . .	4 —	† — <i>Tankervillae</i> R. Br. ( <i>Phajus grandifolius</i> Lour, <i>Limodorum Tan-</i> <i>kervillae</i> Ait.) (China) —	15
— <i>Warszewiczii</i> Ldl. (Neu- granada) . . . . .	10 —	† — <i>Woodfordii</i> Hook. ( <i>Pha-</i> <i>jus maculatus</i> Lindl. (Ostindien) . . . . .	2 —
† <i>Acropera Batemannii</i> . . . . .	1 —	<i>Brassavola Digbyana</i> Lindl. (Honduras) . . . . .	— —
† — <i>Loddigesii</i> Lindl. (Mexico) . . . . .	1 —	— <i>glauca</i> Bat. (Mexico) . . . . .	2 —
† — — <i>concolor</i> Lindl. (Mexico) . . . . .	1 —	<i>Brassia caudata</i> Ldl. (Jamaika) . . . . .	1 15
† — — <i>fuscata</i> Lindl. (Mexico) . . . . .	1 —	— <i>Keilliana</i> Rchb. fil. . . . .	5 —
† — — <i>purpurea</i> (Mex.) . . . . .	1 —	— <i>verrucosa</i> Bat. (Guat.) . . . . .	2 —
† — <i>spec.</i> (Mexico) . . . . .	1 —	<i>Burlingtonia candida</i> Lindl. (Demerara) . . . . .	14 —
<i>Aërides Brockii</i> Bat. ( <i>crispum</i> Lindl.) (Ostindien) . . . . .	— —	— <i>venusta</i> Ldl. (Brasilien) . . . . .	— —
— <i>odoratum</i> Lour. ( <i>coro-</i> <i>natum</i> Rxb.) (Ostind.) . . . . .	— —	— <i>rigida</i> Ldl. (Brasilien) . . . . .	3 —
<i>Anguloa Clowesii</i> Ldl. (Merida) . . . . .	6 —	<i>Calopogon pulchellus</i> R. Br. (Nord-Amer.) . . . . .	15
— <i>Ruekerii</i> Ldl. (Merida) . . . . .	— —	<i>Catasetum atratum</i> Lindl. (Brasilien) . . . . .	10 —
<i>Anisopetalum Careyana</i> Hook. (Nepal) . . . . .	1-2 —	— <i>globissimum</i> . . . . .	5 —
† <i>Anoëtochilus argenteus</i> Hort. (Brasilien) . . . . .	1 15	— <i>floribundum</i> Hook. var. <i>grandiflorum</i> (Brasilien) . . . . .	5 —
— <i>intermedius</i> Hort. . . . .	— —	— <i>Russelianum</i> Hook. (Gua- temala) . . . . .	2 —
† — <i>pictus</i> Ldl. (Brasilien) . . . . .	1 15	— <i>semiapertum</i> Hook. (Bra- silien) . . . . .	— —
— <i>setaceus</i> Bl. (Java) . . . . .	8 —	— <i>tridentatum</i> Ldl. (Bras.) . . . . .	1 15
— <i>xanthophyllus</i> Bl. (Java) . . . . .	10 —	† <i>Gattleya bicolor</i> Ldl. (Bras.) . . . . .	— —
<i>Barkeria elegans</i> Kn. et W. . . . .	12 —	† — <i>citrina</i> Ldl. (Mexico) . . . . .	8 —
— <i>melanocaulon</i> A. Rich. et G. (Mexico) . . . . .	6 —	† — <i>crispa</i> Ldl. (Brasilien) . . . . .	4 —
— <i>spectabilis</i> Ldl. ( <i>Epi-</i> <i>dendron Skinneri</i> ) Bat. (Guatemala) . . . . .	6 —	† — <i>Forbesii</i> Ldl. (Bras.) . . . . .	1 15
† <i>Bifrenaria atropurpurea</i> Lodd. (Brasilien) . . . . .	1 15	† — <i>granulosa</i> Ldl. (Guate- mala) . . . . .	3 —
— <i>aurco-fulva</i> Ldl. (Bra- silien) . . . . .	1 15	† — <i>labiata</i> Ldl. (Brasilien) . . . . .	10 —
		† — <i>Loddigesii</i> Ldl. (Bras.) . . . . .	6 —

Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.	
† <i>Cattleya Mossiae</i> H o o k. (maxima Lindl.) (Venezuela) 2-4 —		† <i>Cymbidium aloae</i> fol. Sw. (China) — 20	
— — 12 St. stark blühb. 18-24 —		— <i>crassifolium</i> Wall. (Ostindien) . . . . . 1 —	
— <i>Pinellii</i> Hort. (Bras.) — —		† — <i>ensifolium</i> Sw. (China) — 20	
† — <i>Skinneri</i> L d l. (Guatem.) 4 —		† — <i>marginatum</i> L d l. (Bras.) 1 10	
<i>Cheirostylis marmorata</i> Lindl. (Dossinia Morr., Anoetochilus) (Indische Archipel) . 10 —		† — <i>sinense</i> Willd. (China) — 15	
<i>Chysis bractescens</i> L d l. (Mex.) 6 —		† — <i>xiphiifolium</i> L d l. (China) 1 —	
† <i>Cirrhaea fusco-lutea</i> Lindl. (Brasilien) . . . . . — 15		<i>Dendrobium aggregatum</i> Roxb. (Ostindien) . . . . . 3 —	
† — <i>viridi-purpurea</i> L o d d. (Brasilien) . . . . . 1 —		— <i>aureum</i> L d l. (Ceylon) 10 —	
<i>Coelia macrostachya</i> Lindl. (Guatemala) . . . . . 2 —		— <i>calceolaria</i> H o o k. (Peru) 4 —	
<i>Coelogyne fimbriata</i> L d l. (China) 2 —		— <i>clavatum</i> Cat. V. Houette . . . . . — —	
<i>Comparettia falcata</i> Poepp. et Endl. (Venezuela) . 8 —		— <i>cupreum</i> Herb. (Ostindien) . . . . . 3 —	
<i>Coryanthes eximia</i> Hort. (Brasilien) . . . . . 8 —		— <i>Dalhousianum</i> Wall. (Ostindien) . . . . . 14 —	
— <i>macrantha</i> Lindl. (Venezuela) . . . . . — —		— <i>Devonianum</i> Paxt. (Ostindien) . . . . . 8 —	
— <i>maculata</i> H o o k. (Demerara) . . . . . 9 —		— <i>fimbriatum</i> H o o k. (Ostindien) . . . . . 2 —	
— <i>Barkeri</i> . . . . . 6 —		— <i>Henshallii</i> L d l. (Java) 10 —	
— <i>speciosa</i> H o o k. (Demerara) . . . . . 6 —		— <i>humile</i> . . . . . 1 —	
<i>Cynochilus chlorochilon</i> Kl. (Venezuela) . . . . . 5-6 —		— <i>Kingianum</i> V. H. (Ostindien) . . . . . 10 —	
† <i>Cypripedium barbatum</i> Lindl. (Mont Ophyr) . . . . . 4 —		— <i>macranthum</i> Hort. (macrophyllum L d l.) (Mannilla) . . . . . 8 —	
† — <i>insigne</i> Wall. (Silhet) — 20		— <i>moniliforme</i> Sw. (Ostindien) . . . . . 3 —	
— <i>javanicum</i> Bl. (Java) . 8 —		— <i>moschatum</i> Wall. (Peru) . . . . . — —	
† — <i>spectabile</i> Sw. (Carolina) — 20		† — <i>nobile</i> Lindl. (China) 2 —	
† — <i>venustum</i> Wall. (Silh.) 1 15		— <i>Paxtonii</i> L d l. (Ostind.) 6 —	
<i>Cyrtochilus flavescens</i> (Mex.) 1 —		— <i>Pierardii</i> Roxb. (euculatum R. Br.) (Ostind.) 1 15	
— <i>leucochilus</i> Planch. (Guatemala) . . . . . 2 —		— <i>pulchellum</i> R x b. (luxifolium) (Silhet) . . . . . 1 —	
— <i>maculatum</i> Kn. et W. (Brasilien) . . . . . 2 —		— <i>pumilum</i> Sw. (Sierra Leona) . . . . . 1 15	
— <i>stellatum</i> L d l. (Bras.) 1 —		— <i>sanguinolentum</i> Lindl. (Ceylon) . . . . . 6 —	
<i>Cyrtopodium Andersoni</i> R. Br. (Ostindien) . . . . . 4 —		† — <i>speciosum</i> Sm. (Neuh.) 1 15	
— <i>punctatum</i> L d l. (Bras.) 4 —		— <i>tortile</i> Hort. Belg. (Ostindien) . . . . . 8 —	
starke Originalknollen.		† <i>Epidendrum adenocarpum</i> La Llav. (Mexico) . 5 —	
— <i>Wilmorei</i> Kn. sehr stark (Demerara) . . . . . 3 —		† — <i>aurantiacum</i> Bat. (Guat.) 4 —	
— <i>spec. nova</i> (Venezuela) 5 —		† — <i>ciliare</i> L. (Westindien) 1 —	
<i>Cyclosia maculata</i> Kl. (Mormodes pardina H o o k.) (Oaxaca) . . . . . 8 —		† — — var. <i>major</i> Hort. (Westindien) . . . . . 1 —	
— — var. <i>concolor</i> (Mormodes pard. var. unicolor) (Mexico) . . . 6 —		† — <i>cinnabarinum</i> Salz. (Pernambuco) . . . . . 2 —	
		† — <i>cochleatum</i> L d l. (Jam.) ½-1 —	

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
†Epidendrum cochleatum majus (Mexico) . . . . .	1 —	†Lycaste gigantea L d l. (Heyn- dericksii) (Caracas) . . . . .	2-4 —
† — elongatum Jac q. (Neu- granada) . . . . .	20 —	† — macrophylla L d l. (Co- lumbien) . . . . .	2 —
† — macrochilum L d l. (Mex.)	2 —	† — picturata . . . . .	8 —
† — — roseum Hook. (Guatemala) . . . . .	5 —	† — Skinneri L d l. (Guatem.)	5 —
† — nutans Sw. (Westind.)	2 —	† — — latimaculata . . . . .	5 —
† — phoeniceum (vanillos- mum Ch. L em.) (Cuba)	4 —	Masdevallia fenestrata R. et P. (Brasilien) . . . . .	1 —
† — selligerum Bat. (Guat.)	— —	†Maxillaria aromatica Hook. (Mexico) . . . . .	1-1 —
— sphaerobulbon (Guat.?)	2 —	† — atro-rubens (Südamer.)	1 —
† — tigrinum L d l. (Neugran.)	4 —	† — Barringtoniae L o d d. (Westindien) . . . . .	2 —
— tovarense Rchb. fil. (Venezuela) . . . . .	10 —	† — Colley Bat. (Mexico)	2 —
Eria floribunda L d l. (Singapore)	1 —	† — foveata L d l. (Xylobium) (Venezuela) . . . . .	1 —
† — stellata L d l. (Ostindien)	15 —	† — Harrisoniae L d l. (Bras.)	2 —
†Eulophia streptopetala L d l. (Cap) . . . . .	3 —	† — leuchochila H ffg. (—)	2 —
†Gongora atropurpurea Hook. (Demerara) . . . . .	2 —	† — Kreysslgii (Guatemala)	2 —
† — — major Hort. . . . .	2 —	† — Parkerii Hook. (Demer.)	2 —
† — — picta Hort. . . . .	2 —	† — pieta Hook. (Brasilien)	1 15
† — bufonia L d l. (Brasilien)	2 —	† — Rollisoni L d l. (Brasil.)	2 —
† — leucochila Ch. L. (Chiapas) . . . . .	2 15	† — stapelioides L k. et Otto (Promenaea) (Brasilien)	1 15
† — maculata L d l. (Guyana)	2 —	† — tetragona L d l. (Brasil.)	1 15
† — — alba L d l. — . . . .	2 —	† — triangularis . . . . .	2 —
† — — pallida — . . . . .	1 15	† — variabilis R. Br. var. unipunctata L d l. (Vera Cruz) . . . . .	1 —
† — odoratissima Ch. L em. (Columbia) . . . . .	2 15	† — Wageneriana Rchb. fil. (Xylobium) (Venezuela)	2 —
†Goodyera discolor R. Br. (Hae- maria) (Brasilien) . . . . .	1-2 —	† — Warreana Lodd. (War- rea tricolor) (Brasil.)	3 —
Houlletia Brocklehurstiana Brog. (Brasilien) . . . . .	8 —	Megaclinium falcatum Lindl. (Sierra Leona) . . . . .	15 —
— vittata (Guyana) . . . . .	12 —	†Miltonia candida L d l. (Brasil.)	8 —
Huntleya marginata Lindl. (Neugranada) . . . . .	10 —	— Clowesiana L d l. (Bras.)	6 —
Laelia acuminata Lind. (Neugr.)	4 —	† — spectabilis L d l. (Bras.)	5 —
— — anceps L d l. (Mexico)	4 —	Myanthus barbatus L d l. (De- merara) . . . . .	5 —
— — superba . . . . .	4 —	— spinosus Hook. (Bra- silien) . . . . .	10 —
— aurantiaca Rich. (Mex.)	5 —	— trifidus Hook. (Bras.)	3 —
— spec. . . . .	2 —	†Neottia speciosa Jac q. (Ste- norhynchus speciosus Rich.) (Columbien) . . . . .	2 —
— superbiens L d l. (Gua- temala) . . . . .	9 —	Octomeria graminifolia Hook. (Antillen) . . . . .	1 —
Leptotes bicolor L d l. (Brasil.)	2 —	†Odontoglossum citrosum L d l. (Mexico) . . . . .	4 —
Lockhartia parthenocomos Rchb. fil. var. pur- purata. (Caracas) . . . . .	5 —	† — grande L d l. (Guatem.)	4 —
†Lycaste biseriata (brevispatha Kl.) (Columbien) . . . . .	5 —	† — Insleayi Bark. (Mex.)	— —
† — Deppei L d l. (Mexico)	1 —	† — pulchellum Bat. (Guat.)	3 —
† — — varietas . . . . .	2 —		

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
† <i>Odontoglossum spec. nova</i>		† <i>Schomburgkia tibicinis</i> Bat.	
(Venezuela) . . . .	6 —	(Mexico) . . . . .	5 —
<i>Oncidium altissimum</i> Sw.		† — <i>undulata</i> (Venezuela)	3-7 —
(Jamaika) . . . . .	1 15	<i>Scuticaria Stelii</i> Ldl. (Maxil-	
— <i>ampliatum majus</i> Ldl.		laria) (Guayana) . . . . .	12 —
(Guatemala) . . . . .	1½-3 —	† <i>Sobralia decora</i> Bat. (Guatem.)	8 —
— <i>Baueri</i> Ldl. (Panama)	2 —	† — <i>liliastrum</i> Ldl. (Guyana)	5-10 —
— <i>carthagenense</i> Sw.		† — <i>macrantha</i> Ldl. (Mex.)	2-4 —
(Westindien) . . . . .	2 —	† — <i>spec. de Moritz</i> (Caracas)	10 —
— <i>Cavendishianum</i> Bat.		<i>Sophronitis grandiflora</i> Ldl.	
(pachyphyllum Hook.)		(Brasilien) . . . . .	10 —
(Mexico) . . . . .	3 —	— <i>isopetala</i> Hffg. (Brasil.)	4 —
— <i>Cebolleta</i> Sw. (juncifo-		† <i>Stanhopea aurea</i> Lodd.	
linum Ldl.) (Columbien)	1 —	(Caracas) . . . . .	3 —
† — <i>ciliatum</i> Ldl. (Brasil.)	4 —	† — <i>Bucephalus</i> Lindl.	
† — <i>divaricatum</i> Ldl. (Bras.)	4 —	(Ecuador) . . . . .	4 —
† — <i>flexuosum</i> Sims. (Bras.)	1 15	† — <i>Cavendishii</i> Ldl. (De-	
— <i>Lanceanum</i> Ldl. (Guyana)	5 —	vonienensis Ldl.) (Peru)	4 —
— — <i>elegans</i> . . . . .	6 —	† — <i>eburnea</i> Ldl. (Süd-Am.)	2 —
— <i>luridum</i> Ldl. (Jamaika)	4 —	† — <i>grandiflora</i> (Lindl.)	
— — <i>guttatum</i> (roseum)		(Trinidad) . . . . .	1 —
(Jamaika) . . . . .	4 —	† — <i>graveolens</i> Ldl. (Guatem.)	4 —
† — <i>Papilio</i> Ldl. (Venezuela)	3 —	† — <i>guttulata</i> Ldl. (Guatem.)	3 —
† — — <i>var. major</i> Hort.		† — <i>insignis</i> Hook. (Brasil.)	1 —
(Venezuela) . . . . .	2-4 —	† — — <i>major</i> (Brasilien)	3 —
— <i>Parkinsoni-num</i> . . . . .	— —	† — — <i>speciosa</i> (Brasil.)	1 15
† — <i>Pinelianum</i> Rich. (Bras.)	3 —	† — — <i>punctatissima</i> (Bras.)	2 —
† — <i>sphacelatum</i> Lindl.		† — <i>Jenischiana</i> Rehb. fil.	7 —
(Mexico) . . . . .	3 —	† — <i>Mertiana</i> Bat. (Mexico)	5 —
<i>Ornithidium coccineum</i> Salisb.		† — <i>oculata</i> Ldl. (Mexico)	1-2 —
(Westindien) . . . . .	1 —	† — — <i>pallida</i> . . . . .	2 —
— <i>Sophronitis</i> Rehb. fil.		† — — <i>punctatissima</i> . . . . .	3 —
(Venezuela) . . . . .	5 —	† — — <i>hypochilio violaceo</i>	
† <i>Peristeria Barkerii</i> Ldl. (Mex.)	3 —	<i>purpureo</i> . . . . .	3 —
— <i>elata</i> Hook. (Columbia)	4 —	† — — <i>Barkeriana</i> . . . . .	4 —
— <i>pendula</i> Hook. (Demer.)	3 —	† — <i>pardina</i> . . . . .	6 —
† <i>Phalaenopsis grandiflora</i> Ldl.		† — <i>quadricornis</i> Lindl.	
(Java) . . . . .	— —	(Columbia) . . . . .	5 —
<i>Pleione maculata</i> Ldl. (Ostind.)	— —	† — <i>tigrina</i> Bat. (Mexico)	4 —
— <i>Wallichiana</i> Ldl. (Beng.)	— —	† — — <i>latimaculata</i> Hort.	
<i>Rhenaanthera coccinea</i> Lour.		V. Houtte (Mexico) . . . . .	4 —
(China) . . . . .	4 —	† — — <i>nigro-purpurea</i> . . . . .	5 —
† <i>Restrepia elegans</i> Karst.		† — — <i>superba</i> H. Belg.	
(punctulata Ldl.) (Merida)	4 —	(Mexico) . . . . .	4 —
† — <i>vittata</i> Ldl. (Caracas)	3 —	† — <i>saccata</i> Bat. (Guatem.)	2 —
<i>Rodriguezia Barkeri</i> Hook.		† — <i>venusta</i> Lodd. (Brasil.)	4 —
(Brasilien) . . . . .	1 15	† — <i>Wardii</i> Lodd. (Caracas)	3 —
— <i>macrostachya</i> Lindl.		<i>Thunia alba</i> Rehb. fil.	
(Südamerika) . . . . .	2 —	(Phajus Ldl.) (Ostind.)	2 —
† <i>Sarcanthus teretifolius</i> Ldl.		<i>Trichopilia candida</i> . . . . .	5 —
(China) . . . . .	2 —	— <i>coccinea</i> Warsz.	
<i>Schomburgkia crispa</i> Lindl.		(Columbien) . . . . .	8 —
(Demerara) . . . . .	3 —	— <i>tortilis</i> Ldl. (Mexico)	1 1
— <i>marginata</i> Ldl. (Surin.)	7 —		

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Trigonidium Egertonianum Bal.		Xylobium squalens L d l. (Bras.)	1 —
(Honduras) . . . . .	2 —	— spec. Wagener . . . . .	3 —
— ringens . . . . .	5 —	†Zygopetalum crinitum Lodd.	
Uropedium Lindenii L d l. (Co-		(Brasilien) . . . . .	3 —
lumbien) . . . . .	25-40 —	† — — coeruleum (Bras.)	3 —
Vanda coerulea Griff. (Silhet)	—	† — — intermedium Lodd.	
— concolor . . . . .	—	(Brasilien) . . . . .	2 —
— Roxburghii R. Br.	—	† — — Makayi Hook. (Brasil.)	2 —
(Ostindien) . . . . .	—	† — — striatum . . . . .	2-3 —
— teres L d l. (Ostindien)	10 —	† — — maxillare Lodd. (Bras.)	3 —
†Vanilla planifolia Andr. (Mex.)	$\frac{1}{2}$ -1 —	† — — stenochilum Lodd.	
Warrea cyanea L d l. (Caracas)	2 15	(Brasilien) . . . . .	2 —
		† — — velutinum Hffg. (Bras.)	3 —

## Palmae, Cycadeae, Pandaneae et Cyclantheae.

Selbst wer sie nie gesehen, diese Königinnen der Pflanzenwelt, der hat vom Ruhme ihrer Schönheit und Nutzbarkeit — wenigstens gelesen. Sie sind in ihrem Vaterlande das Zeichen der Freude — des Sieges — des Friedens — aber auch die Universalquelle alles Nützlichen, denn sie liefern oft ganzen Volksstämmen Kleidung, Wohnung, Speise, Trank, Fahrzeuge, Waffen, kurz Alles, was sie zu ihrer Existenz bedürfen, und bilden somit den würdigsten Vorläufer zur nächsten Gruppe.

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Acrocomia sclerocarpa Mart.		Cyclanthus eristatus Kl. .	1-10 —
sehr stark . . . . .	25 —	— Plumieri Poit. . . . .	5 —
Areca rubra Bory mittel . . .	6 —	Daemonorhops latispinus Hort.	
Arenga saccharifera La Bill.		Amst. (Calamus) . . . . .	— —
sehr stark . . . . .	50 —	— viminalis Hort. Amst.	
Attalea speciosa Mart., zwei-		(Calamus) . . . . .	15 —
jährige Samenpflanzen . . .	5 —	Diplothemium maritimum Mart.	10 —
Brahea dulcis Mart. stark . . .	50 —	Encephalartos horridus Lehm.	
Calamus micranthus Hort.		(Zamia Jacq.) sehr stark	25 —
Amst. . . . .	—	Jubaea spectabilis H. et Kth.	
Caryota urens L. . . . .	10 —	(Cocos chilensis Mol.)	
*Ceroxylon Andicola H. et B.	10 —	stark . . . . .	6 —
Chamaedorea elegans Mart. 5-20	—	Latania borbonica Lam. (Li-	
— Schiedeana Mart. (Kun-		vistonia chinensis	
thia xalapensis Otto et		Mart.) . . . . .	5-300 —
Dietr.) stark. . . . .	6 —	Oenocarpus utilis Kl. (Wein-	
*Carludovica latifolia Ruiz		palme) . . . . .	8-12 —
et Pav. . . . .	3 —	Oreodoxa regia Kth., stark. .	10 —
• — palmata Ruiz et		Pandanus amaryllidifolius	
Pav. . . . .	1-10 —	Roxb. . . . .	1-6 —
• — Plumierii Kth. (palmae-		— graminifolius Hort.	
folia Lodd.) . . . . .	4 —	belg. . . . .	$\frac{1}{2}$ -1 —
Chamaerops excelsa Thbg. . .	3 —	— javanicus fol. var. . . . .	4-6 —
— humilis L. stark . . . . .	2-15 —	— pygmaeus Pat. Thou-	
— Palmetto Michx. . . . .	5 —	ars. . . . .	$\frac{1}{2}$ -1 —
Cocos flexuosa Mart. sehr stark	40 —	— reflexus Lodd., Desf.	
— lapidea Gaertn. . . . .	10 —	sehr stark . . . . .	20 —
— oleracea Mart. . . . .	10 —	— utilis Bory, sehr stark	25 —
Corypha Gebanga Blume. . .	25 —	Phoenix dactylifera L. (Dattel-	
Cycas revoluta Thbg. (Sago-		palme) sehr stark . . . . .	3-10 —
palme) . . . . .	1-100 —		



	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Phoenix farinifera Roxb. (Elate sylvestris L.) . . .	4-30 —	brook, ausgezeichnet stark . . . . .	200 —
Rhapis flabelliformis Ait. . .	2-8 —	Syagrus botryophora Mart. (Cocos Mart. olim) sehr stark	10 —
Sabal Adansoni Guerns (Rhapis acaulis Hort.) . . .	1-3 —	Zamia media W. . . . .	10 —
— Blackbourniana Glaze-		— muricata W., stark	10-15 —

## Pflanzen, welche zu officinellen u. technischen Zwecken verwendet werden, sowie tropische Frucht bäume.

Das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden, ist der Wahlspruch der Zeit. Dass er auch in der Wahl seiner Lieblinge des Pflanzenreichs anwendbar, bestätigt die nachstehende Gruppe; und es wird nicht mehr allein Vergnügens- und Luxus Sache sein, die Kinder der Tropenwelt zu pflegen, wenn man gleichzeitig aus dieser Abtheilung wählt, die des Lehrreichen so Vieles bietet.

Bemerkung. Alle Pflanzen mit vorgesetztem **k.** gehören ins Kalthaus, während das hinten stehende **k** — wie überall — Knollengewächs bedeutet.

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Adansonia digitata L. (Affenbrodbaum, Baobab.) . . .	— —	Curcuma Zedoaria Rose. (Amomum Zerumbet. Kön.) (Zittwerwurzel) . . .	<b>k</b> — 20
Amomum Cardamomum L. (Kardamom) . . . . .	5 —	Dracaena Draco L. (Drachenbluthaum) sehr stark .	10 —
Anona Humboldtii (Flaschenbaum)	6 —	<b>k</b> Drimys Winteri Forst. (Gewürzrinde) . . . . .	— —
Artocarpus incisa L. fil. (Brodbaum) . . . . .	10 —	Eugenia Jambosa L. (Jambusenbaum) . . . . .	2-3 —
Bambusa arundinacea Retz. (Bambusrohr) . . . . .	1 —	Ficus elastica Roxb. (Gummibaum) . . . . .	1-10 —
— aurea . . . . .	1 —	Garcinia Mangostana L. (Mangostane) . . . . .	— —
Bixa Orellana L. (Orleanbaum)	10-20	Guajacum arboreum H. B. Kth. (Guajakholz) . . . . .	3 —
Brucea antidysenterica Mill. (ferruginea L'Her.) (falsche Angustura) . . .	— —	— officinale L. . . . .	— —
Canella alba Murr. (Wintera Canella L.) (Weisser Zimmt- od. Canellbaum)	6 —	Hibiscus Abelmoschus L. (Bisambisch, Moschuskörner) —	10
Capparis ferruginea L. (Eine Sorte Kapperstrauch) . . .	20 —	Ilex paraguayensis Lam. var. angustifolia. (Paraguaythee) . . . . .	10-20
Caryophyllus aromaticus L. (Gewürznelke) . . . . .	— —	<b>k</b> Illicium anisatum L. (Sternanis) . . . . .	10
<b>k</b> Cassia lanceolata Forsk. (Cassia Senna L. var. alba) (Sennesblätter) . . .	10 —	— religiosum Sieb. et Zucc. . . . .	15
Cedrela odorata L. (Bastardeeder)	— —	Kämpferia Galanga L. (Galgantwurzel) . . . . .	<b>k</b> 1 —
Ceratonia Siliqua L. (Johannisbrodbaum) . . . . .	5 —	Lagetta Lintearia Lam. (Spitzenbaum) . . . . .	— —
Cinchona Calisaya Weddell (Königs-Chinarinde) . . .	— —	<b>k</b> Laurus Camphora L. (Camphora officinarum Bauh.) (Kampherbaum) —	15
Coffea arabica L. (Mokka Hort.) (Kaffeebaum) . . . . .	1-5 —	<b>k</b> — Cassia Roxb. (Cinnamomum albiflorum N. E.) (Zimmetcassie) . . .	10-20
• — mauritiana Lam. . . . .	1 —		
— opulifolia Forst. (Pavetta)	20 —		
Curcuma fusca (Gelbwurz) <b>k</b> —	15		
— longa L. . . . .	<b>k</b> — 15		
— rubricaulis Hort. . . . .	<b>k</b> 1 —		

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Laurus Cinnamomum N. E. (Cinnamomum zeylanicum Blume, C. verum Sw.) (Aechler Zimmt.)	1-4 —	Psidium Cattleyanum Sab. (Guajavabaum) . . .	k — 10
k — nobilis L. (Lorbeerbaum) . . . . .	— 10-20	— ferrugineum Presl. . .	— 10
Limonia spectabilis (Limonie)	1 —	— montanum Sw. . . . .	— 10
Lucuma deliciosa Planch. et Lind. . . . .	— —	Quassia amara L. (Bitterholz)	— —
Mammea americana L. (Mommey)	5 —	Saccharum officinarum L. (Zuckerrohr) . . . . .	1-2 —
Mangifera indica L. (domestica G.) (Mangobaum) . . .	2-4 —	— violaceum Juss. . . . .	1 —
Melicocca bijuga L. (Honigbeere)	4 —	Sapindus Saponaria L. (Seifenbaum) . . . . .	1-2 —
Micania Guaco Humb. (Guako)	r — 20	Simaba Cedron (Cedronsamen)	— —
*Musa Cavendishii Hook., Paxt. (Banane, Pisang, Paradiesfeige) . . .	1-6 —	Smilax Sarsaparilla L. (Sarsaparille) . . . . .	— —
* — Dacca Mak. . . . .	1-6 —	Strychnos Curare Cat. Lind. (Wurara Giftbaum) . .	r 1-2 —
* — rosacea Jacq. . . . .	1-3 —	Swietenia Mahagony L. (Mahagonybaum) . . . . .	— —
* — Zebrina H. Van Houtt.	6 —	Tamarindus indica L. (Tamarinde) . . . . .	1-2 —
Myginda uragoga Jacq. . . . .	— —	Theobroma Cacao L. (Cacao- baum) . . . . .	8 —
Myristica Horsfieldii Sp. (Horsfieldia odorata W.) (Eine Art Muscatnuss) . . .	— 15	— montana Hort. belg. (Bergcacao) . . . . .	— —
Myrtus Pimenta L. (Eugenia D. C.) Nelkenpfeffer . .	— 15	kThea assamica Hort. Angl. (Assam Thee) . . . . .	— —
Persea gratissima Gaert. (Laurus Persea L.) (Avogadobaum) . . . . .	3 —	k — Bohea L. (schwarzer Thee) . . . . .	— 15
— macrocarpa . . . . .	— —	k — — laxa Ait. . . . .	— 15
Piper Betel L. (Betelpfeffer) . .	1 —	k — viridis L. (grüner Thee)	— 15
— nigrum L. (schwarz. Pf.)	10-20	Vanilla planifolia Andl. (Vanille) . . . . .	1-1 —
Pogostemon Patschouli Pelod. —	5	Zingiber Cassumunar Roxb. (Ingwer) . . . . .	k — 10
kPrunus Laurocerasus L. (Kirsch- lorbeer) . . . . .	5	— officinale Rosc. . . . .	k — 20

## Plantae aquaticae.

### Wasserpflanzen.

Nun haben auch unsere Bassins ihren schönen Schmuck erhalten; sie sind zu klein, man erweitert sie aller Orten, seit man sich von der grossen Dankbarkeit, der so lange und unverdient zurückgesetzten Wasserpflanzen überzeuge. Wer im vergangenen Sommer mein grosses Bassin im Freien sah, dem wird es noch eine freundliche Erinnerung sein; denn selbst die sonst so verzärtelten Nelumbium sind darin heimisch, und während 6 Monaten bedeckte sich das Bassin mit den schönsten Blüten, in weiss, blau, roth, gelb, Veilchenduft ringsum verbreitend.

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
†Anemiopsis californica Hook. —	10	Euryale ferox Salisb. . . . .	2 —
†Arum div. spec. v. Aroideae —	—	Hydrochlaeis Plumieri (Limno- charis Rich.) . . . . .	— 20
†Caladium et Colocasiae desgl. —	—	Limnocharis Humboldtii Rich. —	5-15
†Ceratopteris thalictroides Bogn. . . . .	— 10	Nelumbium Count of Thun h. Tetschen. . . . .	5 —
Cyperus alternifolius L. . . . .	—	— flavescens h. Tetschen	3-10 —
— pungens Hort. Berol. (textilis Thbg.) . . . . .	1-1 —	— speciosum v? caspium D C.	5 —

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Nelumbium pekingense fl. albo		Nymphaea poecila Lehm. (cy-	
h. Tetschen. . . . .	3 —	nea Hort.) . . . . .	20
Nuphar luteum Sm. . . . .	5 —	— scutifolia D C. . . . .	20
Nymphaea alba L. . . . .	5 —	— semiaperta Klinggr. . . . .	1 —
— biradiata Sommer-		— stellata W. . . . .	1 —
auer . . . . .	10 —	— versicolor Roxb. . . . .	1 —
— cyanea Roxb. . . . .	20 —	†Papyrus antiquorum Lk. (Cy-	
— gigantea Hook. Samenpflanzen vom Herbst	10 —	perus Papyrus L.) . . . . .	1 10
Knollenpflanzen . . . . .	30 —	†Philodendron s. Aroideae . . . . .	— —
— guineensis Schum. (mi-		Pistia occidentalis Bl. (stratio-	
crantha Hort.) . . . . .	1 —	tes Hort., Zala asia-	
— Kosteletzkyi Palliardi . . . . .	20 —	tica L.) . . . . .	5-10
— Lotus L. . . . .	1 —	Pontederia cordata L. . . . .	10 —
— var. major Lehm. (N. dentata Planch. non Thonn., N. Ortgiesii Planch.) . . . . .	1 —	— crassipes Mart. (Eich-	
— odorata Ait. . . . .	20 —	hornia speciosa Kth.) . . . . .	10
— grandiflora . . . . .	20 —	†Pothos v. Aroideae . . . . .	— —
— Ortgiesiano. rubra Planch. . . . .	½-2 —	†Saururus cernuus L. . . . .	15
		Thalia dealbata L. . . . .	20
		Vallisneria spiralis L. fem. . . . .	10
		Victoria regia Ldl. . . . .	4-12 —
		Die mit † bezeichneten dürfen nur bis an den Rand ins Wasser gestellt werden.	

## Kalthauspflanzen.

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Abutilon Bedfordianum Hort.		Agathosma mollis Bartl.	
angl. . . . .	f—7-20	Wendl. . . . .	5
— insigne Planch. . . . .	f — 10	*Agave americana L. sehr stark	20 —
— parviflorum H. . . . .	7 —	— fol. var. . . . .	15
— pannosum . . . . .	25 —	— havannensis Hort. . . . .	20
— striatum Ldl. . . . .	f—5-20	— lurida Ker. . . . .	20
— Van Houttei . . . . .	f — 10	Alonsoa grandiflora Hort. . . . .	f — 5
— venosum Ch. Lem. . . . .	f—7-20	Alstonia scholaris R. Br. . . . .	10
Im Sommer decoriren die Abutilon köstlich im Freien, im Winter erfreuen die herrlichen Glöckchen. Diese sind gross bei dem prachtvollen Abutilon venosum, dem A. insigne durch seine unübertreffliche Zartheit den Rang streitig zu machen sucht.		Ursprünglich Warmhauspflanze kommt sie bei mir im kalten ganz gut fort.	
Acacia alata R. Br. . . . .	20	Alstroemeria psittacina Lehm. . . . .	k — 5
— brevifolia Lodd. . . . .	5-10	Alyssum saxatile L. fol. var. . . . .	st — 5
— cultriformis Hook. . . . .	10	Amaryllis formosissima L. . . . .	fz — 5
— cyanophylla Ldl. . . . .	20	Amygdalus pumila L. . . . .	b — 10
— decipiens R. Br. . . . .	15	Andromeda floribunda Bot.	
— linearis Ker. . . . .	10	Mag. . . . .	e — 5
— lophantha W. . . . .	5-10	— rosmarinifolia Pursh . . . . .	e — 10
— paradoxa D C. . . . .	5-15	Anemone japonica Zucc. et	
— theiantha H. Petrop. . . . .	10	Sieb. . . . .	e st — 5
Agapanthus umbellatus L'Her. . . . .	f — 5	Antirrhinum Harlequin, hybr.	
		hort. . . . .	f st — 5
		Eine köstliche bunt gefleckte und gestreifte Landpflanze.	

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
* <i>Aralia japonica</i> Thbg. . . . .	— —	<i>Casuarina stricta</i> Ait. . . . .	— —
* <i>Araucaria Bidwillii</i> Hook. . . . .	1 —	— <i>tenuissima</i> Sbr. . . . .	1 —
* — <i>Cunninghami</i> R Br. . . . .	20 —	— <i>torulosa</i> Ait. . . . .	— —
* — <i>imbricata</i> R. et P. . . . .	3 —	<i>Cedrus argentea</i> Hort. . . . .	20 —
<i>Aristea cyanea</i> Ait. . . . .	10 —	<i>Centaurea argentea</i> L. . . . .	5 —
Büht sehr dankbar fast den ganzen Sommer — im schönsten Smalteblau!		<i>Cephalotaxus nucifer</i> . . . . .	10 —
† <i>Arundinaria falcata</i> N. E. . . . .	7-15 —	<i>Cereus nycitcallos</i> Lk. et Otto. . . . .	5 —
† <i>Aucuba japonica</i> Thbg. . . . .	5-20 —	<i>Chironia floribunda</i> Paxt. . . . .	5 —
<i>Beaufortia decussata</i> RBr. . . . .	5 —	<i>Chorizema cordatum</i> Lindl. . . . .	10 —
— <i>villosa</i> H. Berol. . . . .	10 —	— <i>elegans</i> Hort. . . . .	10 —
<i>Bellis perennis</i> Highlander st . . . . .	5 —	— <i>Hügelii</i> Hort. . . . .	15 —
<i>Benthamia fragifera</i> Lindl. . . . .	5 —	— <i>varium</i> Hort. . . . .	10 —
<i>Berberis Aquifolium</i> Pursh. . . . .		<i>Cistus vaginatus</i> Ait. . . . .	7 —
( <i>Mahonia</i> Nutt.) . . . . .	10 —	<i>Citrus Aurantium</i> L. . . . .	10 —
<i>Beschornia tubiflora</i> Hook. . . . .	15 —	— <i>sinensis</i> . . . . .	1 —
<i>Bignonia capensis</i> Thbg. ( <i>Tecomoma</i> G. Don.) . . . . .	5 —	— <i>vulgaris</i> Risso fol. var. . . . .	15 —
— <i>jasminoides</i> Cunn. . . . .	5 —	— <i>myrtifolia</i> . . . . .	10 —
— <i>pandorana</i> Andr. . . . .	5 —	— <i>salicifolia</i> . . . . .	15 —
<i>Billardiera longiflora</i> La Bill. . . . .	5 —	<i>Clematis azurea</i> Sieb., <i>grandiflora</i> . . . . .	15 —
An Drathgittern gezogen gewahrt sie durch ihr feines Laub und die herrlich grossen blauen Beeren einen eigenthümlichen Reiz.		— <i>bicolor</i> Ldl. . . . .	15 —
<i>Borbonia angustifolia</i> Lam. . . . .	8 —	— <i>florida</i> Thbg. . . . .	10 —
<i>Bouvardia Jacquinii</i> H. B. ( <i>Houstonia coccinea</i> Andr.) . . . . .	5 —	— <i>fl. pl.</i> . . . . .	15 —
— <i>leiantha</i> Benth. . . . .	10 —	— <i>patens</i> Desne. Helene (Siebold) . . . . .	10 —
— <i>splendens</i> Hort. . . . .	10 —	— (Siebold) . . . . .	25 —
<i>Brachysema undulatum</i> Ker. . . . .	5 —	— <i>Viticella</i> L. fl. pl. . . . .	10-20 —
<i>Browallia Jamesonii</i> Benth. . . . .	5 —	Den schönsten Schmuck für Lauben u. dergl. bieten gewiss diese Clematis; gleichen doch <i>C. azurea</i> , <i>bicolor</i> und <i>florida</i> an Grösse und Schönheit den Passifloren.	
Die freundlichen roth und gelben Blumen verleihen unseren Caphäusern einen reichen Schmuck.		<i>Clanthus magnificus</i> Cunn. . . . .	10 —
<i>Brugmansia bicolor</i> Pers. β. <i>lutea</i> Hort. . . . .	15 —	Ueberrifft an Grösse und Farbenpracht unseren alten Liebling, den <i>punicus</i> . . . . .	
<i>Brunia abrotanoides</i> L. . . . .	5 —	— <i>punicus</i> Sol. . . . .	5 —
<i>Buxus sempervirens</i> L. fol. var. . . . .	5 —	<i>Cobaea stipularis</i> Lindl. . . . .	10 —
<i>Calystegia pubescens</i> Lindl. . . . .		<i>Coleonema album</i> Bartl. . . . .	
fl. pl. . . . .	5 —	Wendl. . . . .	5 —
Fine der dankbarsten Schlingpflanzen für's Freie, mit gefüllten fleischfarbenen Blüten.		<i>Correa alba</i> Andr. . . . .	5 —
* <i>Canna discolor</i> Ldl. . . . .	7 —	— <i>Grevillei</i> Hort. . . . .	15 —
* — <i>gigantea</i> Dsf. . . . .	10 —	— <i>rufa</i> Gärt. fil. . . . .	10 —
— <i>glauca</i> L. . . . .	10 —	— <i>speciosa</i> Andr. . . . .	15 —
* — <i>indica</i> L. . . . .	5 —	<i>Crassula coccinea</i> L. . . . .	5 —
* — <i>Warszewiczii</i> Otto et Dietr. . . . .	5-20 —	Zu alt und bekannt mit ihren feurigen lang anstehenden Blumenbüscheln, um einer Anpreisung zu bedürfen.	
* — <i>spec. ex Havannah</i> . . . . .	5-10 —	<i>Cryptomeria Lobbii</i> . . . . .	2 —
<i>Canna's</i> sind unbestritten die schönsten Blattpflanzen für's freie Land, und lassen sich im Winter ohne Töpfe, hinter Stellagen eingeschlagen, gut durchbringen.		<i>Cuphea Danielsii</i> Hort. . . . .	5 —
<i>Cantua dependens</i> Pers. . . . .	15 —	— <i>floribunda</i> Lehm. . . . .	5 —
— <i>splendens</i> Hort. . . . .	5 —	— <i>platycentra</i> Hort. non Benth. ( <i>igneus</i> DC.) . . . . .	5-10 —
Wenn es gelingt, sie frühzeitig zur Blüthe zu bringen, so sind sie unschätzbare Acquisitionen.		— <i>strigulosa</i> Kunth. . . . .	5 —
		Blühen sowohl im Lande als im Topfe, und sind die Blüten auch klein, so stehen	

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
sie dafür in imponirenden Massen als Schmuck fast das ganze Jahr hindurch.		seit einem Vierteljahr und verspricht noch lange eine Zierde des Hauses zu bleiben.	
† Cupressus funebris Lindl. — 15		Diplacus puniceus Nutt. . . — 5	
† — sempervirens L. . . e — 5-10		Echeveria bracteolata L. k. Kl. O. — 5	
Cyclamen africanum Hort. (macrophyllum Hort.) k 1 —		— caespitosa DC. . . — 10	
— aleppicum Hort. . . k — 10		— campanulata Kze. . . — 10	
— coum Mill. . . k — 10		— coccinea DC. . . — 5	
— europaeum L. . . k — 7		— grandifolia Haw. . . — 5	
— hederacifolium Ait. k — 10		— pumila V. Houtte. . . — 5	
— persicum Mill. . . k — 7		— retusa Lindl. (fulgens V. Houtte) . . . — 10-15	
Cytisus Atleianus Hort. . . — 15		— rosea Lindl. . . — 5	
Unzählige goldene Trauben bedecken ihn im zeitigen Frühjahr; daher in jedem Garten willkommen.		— secunda Lindl. . . — 5	
Daphne Cneorum L. fol. var. — 10		Besonders jung, sehr gesucht als Nipptischpflanzen, wozu sie ganz vorzüglich passen.	
— Dauphini Hort. . . — 5-15		Edwardsia grandiflora Salisb. — 10	
— Fortunei Lindl. . . 1 10		Epacris paludosa R. Br. . . — 15	
— odorata Thbg. . . — 10		Erica herbacea L. . . — 5	
— — fol. var. . . — 10		— gracilis Wendl. var. autumnalis . . . — 5	
— Van Houttei (Piafch?) 1 —		— mediterranea L. . . — 5	
Schon der köstliche Duft der Blumen, leichteste Cultur und zeitiges Blühen genügen zur Empfehlung aller Daphnen.		— odorata Andr. . . — 5	
Datura arborea Hort. . . f 3-3		Erythrina crista galli L. . . f — 15	
Kaum weiss ich die Frage zu beantworten, warum diese köstliche Pflanze so wenig zu treffen ist, — denn wo sie blüht, und sie thut es am besten im freien Lande, mit jedem Boden vorlieb nehmend, da kann sie unmöglich ungesehen bleiben, stände sie auch im äussersten Winkel, denn ihre langen grossen blendend weissen Blumen leuchten unendlich weit! Dabei ist sie so hart, dass selbst, während der Blüthe ausgehoben, sie noch lange fortführt, das Haus zu zieren, — und zugleich so bescheiden, dass sie nach dem Blühen mit jedem nur irgend trockenen frostfreien Platzchen vorlieb nimmt.		Was diese Pflanze zu leisten vermag, geht daraus hervor, dass ein mässig altes Exemplar bei mir mit nahe 20,000 grossen rothen Blumen jährlich prangte; nur muss sie im freien Grunde stehen.	
Deutzia crenulata Sieb. et Zucc. . . e — 15		— spec. (Wagener.) f 1 —	
— gracilis Zucc. (vera!) e — 5		— sp. e Columbia . . . — 20	
— scabra Thbg. . . b — 5-10		Escallonia macrantha Hook. et Arn. . . — 10	
— sanguinea Hort. . . b — 7		Espeletia nerifolia H. B. K. . . —	
Diese und D. scabra lassen sich sehr gut treiben und machen mit ihren zahllosen weissen Tränken einen guten Effekt.		Eucalyptus cordata Labill. —	
Dianthus Louis Napoleon Baudin. . . st e — 10		— robusta Sm. . . —	
Dielytra spectabilis DC. (Di-centra Hort.) . . st b — 5		Eucomis punctata Ait. . . z — 10	
Unläugbar eine der schönsten zierlichsten Stauden.		Eugenia australis Wendl. 5 Ngr. — 1	
Dillenia scandens W. . . r — 5-10		Eupatorium glaucum Hort. . . — 10	
Diosma ciliata Berg. . . — 5		Blüht sehr dankbar im Winter.	
— foetida Spr. . . — 5		Euthales macrophylla Lindl. f — 5	
— formosa . . . — 5		Ihre leichtgebauten mit unzähligen gelben Blumen übersäeten weit verzweigten Trauben imponiren im Lande ungemein.	
— rubra L. . . — 5		Evonymus japonicus Thbg. fol. var. . . f — 5	
Diplacus glutinosus Nutt. var. grandiflorus . . . — 20		Fabiana imbricata R. P. . . — 5	
Ein diesjähriger Steckling blüht schon		Ferraria Tigridia Curt. (Tigridia Pavonia Pers.) k f — 2	
		Bei sonniger Lage ist's eine unübertroffene Farbenpracht, mit welcher im Sommer auf grösseren Gruppen dieser alte Liebling prangt.	
		Fitz-Roya patagonica Hook. fil. . . . . 3 —	
		Frenela australis Mirb. (Cal-litris) . . . . . 1 —	
		Funkia lanceaefolia Spr. fol. var. — 2	
		Gaultheria Shallon Pursh. . . — 5	
		Gazania rigens R. Br. . . — 5	

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
Genista linifolia L. stark . . .	20	Jasminum odoratissimum L. . .	5
Gladiolus Gandavensis H. Van		— triumphans Hort. r	5
Houtte. . . . .	z — 5	Jovellana punctata R. P. (Cal-	
— Louis Van Houtte Truf-		ceolaria violacea Cav.) —	10-20
faut . . . . .	z — 15	Wird besonders von Belgien aus sehr em-	
Glycine sinensis Curt. f	r — 10	pfohlen. Wenn sich von ihrer dichten Be-	
Reizendes Laubwerk und köstlich blaue		laubung auf eben so reiches und schönes	
Blumentrauben machen sie würdig, das feinste		Blühen schliessen lässt, so verdient sie das	
Caphaus zu schmücken.		Lob, was man ihr spendet.	
Gnaphalium crassifolium h. Be-		Kalmia glauca Ait. . . . .	10
rol. . . . .	5	— spec. . . . .	10
Gnidia virescens Wickstr. . .	5	Kennedyia apetalia Lodd. r	10
Grevillea Baueri R. Br. . . .	10	— Baumanniana Ch. Lem. r	10
— Lawrenciana h. Angl. . .	10	— monophylla Vent. r	5
— rosmarinifolia Cnng. —	5-10	— nigricans Lindl. r	10
— Thelemanniana Hügel —	10	— purpurea Hort. (ovata	
Habrothamnus corymbosus Endl. —	10	Ker.) . . . . .	10
— elegans Ad. Brogn. . .	10	— rubicunda Vent (Glycine	
— fasciculatus Endl. . .	10	Curt.) . . . . .	r — 10
— Hügelii Hort. . . . .	10	Kerria japonica DC. (Corchorus	
— roseus Hort. . . . .	5	japonicus L.) . . . .	5
Zum Auspflanzen ist nichts empfehlens-		Lasiopetalum quercifolium	
werther als Habrothamnus.		Andr. . . . .	5
Hardenbergia Comptoniana		Laurus glauca Thbg. . . .	20
Benth. . . . .	r — 10	Leptospermum accerosum h.	
Hedera algeriensis latifolia r	10	Berol. . . . .	5
Unter allen bekannten der grösstblättrige		— attenuatum Sm. . . .	5
Ephen.		— lanigerum Ait. . . .	5
— arborea L. Sw. . . .	r — 5	— multiflorum Cav. . . .	5
— Helix L. albo-variegata r	10	— scoparium Forst. . . .	5
— Roegneriana . . . .	r — 10	Leucadendron hirsutum Hffg. —	10
Heimia myrtifolia Cham.		— obliquum R. Br. . . .	10
Schldl. . . . .	5-20	Leucophyllum ambiguum H. B. —	10
Helianthemum atropurpureum f	5	Lilium eximium Curt. . z e	20
Helichrysum selinum Less. . .	10	— lancifolium album Thbg. $\frac{1}{2}$ -2	—
Heliotropium grandiflorum f	5	— — var. punctatum z e $\frac{1}{2}$ -2	—
— Perfection . . . .	f — 5	— — roseum punctatum	
— Premice . . . .	f — 5	Geitner . . . . z e $\frac{1}{2}$ -2	—
— submolle Kl. . . .	f — 10	— — rubrum . . z e $\frac{1}{2}$ -2	—
— Triomphe de Liège f	5	— — speciosissimum	
— Voltaireanum . . . f	5	Geitner . . . . e 1-3	—
Es genügt wohl zu sagen, dass die Damen		Den Lilien, den ältesten Bewohnern un-	
Nichts dem Vanillegeruch vorziehen, daher		serer Garten, das Wort reden, ist überflüssig;	
die grosse Vorliebe für Heliotropium. Die		was wir aber durch diese neueren Erschei-	
neuen Varietäten verbinden schönen Blüthen-		nungen gewonnen, ist ausserordentlich. Denn	
schmuck mit dem köstlichsten Vanillensarom.		nicht nur, dass sie unter leichter Bedeckung	
Hydrangea hortensis Sm. . . e	5	ebenfalls unsere Winter aushalten, sondern	
— japonica Sieb. . . . e	5	ibr Vanillegeruch und das prachtvolle dun-	
Hypericum monogynum L. . . .	5	kelrothe Colorit in den mannigfachsten	
Iris Pseudacorus L. . . . k	5	Schattirungen bis zum weissen Rand; sind	
— Susiana . . . . k	10	Vorzüge, die der Erwähnung und der Hin-	
Indigofera Dosua Hamilt. . .	10	deutung werth, dass der Garten, dem diese	
— verrucosa Grah. . . .	10	Lilien fehlen, — dem edelsten Schmucke	
Jacksonia lucida H. Jen. . . .	10	entsagt!	
Jasminum azoricum L. . . . r	5	Limonia australis Cnng. . $\frac{1}{3}$ -1	—
— dianthifolium H. V.		Lobelia cardinalis L. . . .	5
Houtte . . . . .	r — 10	— Erinus grandiflora L. . .	5

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
<i>Lopezia macrophylla</i> Benth.		<i>Olea linifolia</i> . . . . .	5
( <i>Jehlia fuchsoides</i> Hort.		— <i>undulata</i> Jacq. . . . .	10
German.) . . . . .	20	<i>Oxalis Bowei</i> Ait. . . . .	5
— <i>villosa</i> Hort. . . . .	5	<i>Parsonsia albiflora</i> Raoul ( <i>heterophylla</i> A. Cunn.) . . . . .	25
<i>Magnolia fuscata</i> Andr. . . . .	10	<i>Passerina filiformis</i> L. . . . .	5
— <i>punila</i> Andr. . . . .	1	<i>Patersonia bicolor</i> F. Müll. . . . .	15
<i>Mahonia Fortunei</i> . . . . .	f	<i>Paulownia imperialis</i> Sieb et	
— <i>japonica</i> D.C. . . . .	—	Zucc. . . . .	b f 1-3
— <i>repens</i> G. Don. . . . .	10	<i>Pentstemon albidum</i> Nutt. . . . .	f
<i>Marianthus coeruleo-punctatus</i>		— <i>cordifolium</i> Benth. . . . .	f
Lk. Kl. Otto . . . . .	r	— <i>Eclausi</i> H. Belg. . . . .	f
Es giebt kaum etwas niedlicheres, als diese		— <i>fruticosum</i> . . . . .	f
Pflanze, an Drahtgitterchen in den feinsten		— <i>gentianoides</i> Hort. (P.	
Bogenformen gezogen.		Hartwegii Benth.) . . . . .	f
<i>Maurandia Barkleyana</i> L. d. l. . . . .	f r	— <i>Murrayanum</i> Hook. . . . .	f
<i>Melaleuca armillaris</i> Sm. (alba			
Hort.) . . . . .	5	Die langen schönen rothen Glocken auf	
— <i>decussata</i> R. Br. . . . .	5	hohen Rispen erscheinen in Massen wäh-	
— <i>hypericifolia</i> Sm. . . . .	5	rend des Sommers im Lande; im Herbst	
— <i>linarifolia</i> Sm. . . . .	10	noch spät erfreuen sie uns im Hause durch	
— <i>lycopodioides</i> Wendl. . . . .	10	dankbares Blühen, und können nicht genug	
— <i>Preissiana</i> Schauer. . . . .	10	empfohlen werden.	
— <i>pulchella</i> R. Br. . . . .	10	<i>Petunia</i> Hybriden; <i>admirabilis</i> Eb. . . . .	10
— <i>splendens</i> Hort. . . . .	5	— <i>Admiral</i> Dundas Wen. . . . .	10
Ist die köstlichste aller Melaleuken, die		— Fürst Günther von	
sich vor den übrigen durch Blumenpracht,		Schwarzburg Eb. . . . .	10
jene aber als gute Bouquetpflanzen aus-		— <i>Ruhm v. Erfurt</i> . . . . .	10
zeichnen.		— v. Thüringen Eb. . . . .	10
— <i>sp. n. Vandiemensland</i> . . . . .	10	— <i>Sir John Falstaff</i> . . . . .	10
— <i>squamea</i> La Bill. . . . .	10	— <i>striata formosissima</i> V. H. . . . .	10
— <i>thymifolia</i> Sm. . . . .	5	<i>Phyllica buxifolia</i> L. . . . .	10
— <i>viminea</i> L. l. . . . .	5	— <i>ericoides</i> L. . . . .	5
— <i>violacea</i> Schauer . . . . .	5	<i>Phlomis ferruginea</i> Ten. . . . .	5
<i>Menispermum laetifolium</i> R. x b. . . . .	1-1	<i>Phlox depressa</i> Criterion L. . . . .	10
<i>Mentha piperita</i> L. fol. var. <i>st.</i> . . . .	5	— <i>Drummondii</i> Radezky . . . . .	10
<i>Mesembryanthemum blandum</i>		— <i>Roi Leopold V. Houtte</i> . . . . .	10
Haw. . . . .	5	Drei der schönsten Erscheinungen dieser	
— <i>echinatum</i> Ait. . . . .	5	reichen Gattung.	
— <i>violaceum</i> D.C. . . . .	5	<i>Pimelea decussata</i> R. Br. . . . .	10
<i>Metrosideros lanceolata</i> Sm. . . . .	5-20	<i>Pittosporum Mayi</i> Hort. Belg. . . . .	10
— <i>lilacina</i> . . . . .	5-20	— <i>Tobira</i> Ait. . . . .	1-2
— <i>semperflorens</i> Lodd. . . . .	1-4	<i>Plumbago Larpentae</i> Lindl. . . . .	5
<i>Mimulus moschatus</i> Dougl. . . . .	5	<i>Podocarpus pungens</i> Hort. . . . .	10
<i>Mitraria coccinea</i> Cav. . . . .	10	<i>Polygala grandis</i> . . . . .	5-10
Fast aus jedem Blattwinkel hängen die		— <i>myrsifolia</i> L. . . . .	5
kleinen feurigen Glöckchen herab, so dass		<i>Potentilla Luciae</i> . . . . .	ste
sie eben so reich als imposant blüht.		Unendlich haben sich diese alten Lieb-	
<i>Morina longifolia</i> D.C. . . . .	7	linge vervollkommenet; ich nahm nur den	
<i>Mühlenbeckia complexa</i> Meis n. r . . . . .	5	prachtvollsten hier auf.	
<i>Myosotis azorica</i> H. C. Wats. . . . .	5	<i>Primula acaulis</i> A. l. alba simplex . . . . .	10
<i>Myrtus communis</i> L. . . . .	5	— <i>maculata</i> . . . . .	20
— <i>annulata hybrida</i> . . . . .	5-10	— <i>rosea intus lutea</i> . . . . .	20
— <i>fl. pleno</i> . . . . .	5	— <i>alpina</i> Schleich. . . . .	5
— <i>fol. variegatis</i> . . . . .	7	— <i>Auricula</i> L. nigra plena . . . . .	20
— <i>bullata</i> Salisb. . . . .	10	— <i>Luiker</i> aus einem	
<i>Nicotiana glauca</i> Grah. . . . .	f 1-3	Mustersortiment à . . . . .	5

	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
<i>Primula ciliata</i> Schrk. . . . .	5	lungeberichte gelesen, wird über sie, das un-	
— <i>farinosa</i> L. . . . .	5	getheilte Lob gehört haben; sie verdient	
— <i>integrifolia</i> D C. . . . .	5	es aber auch, denn selbst der kleinste	
— <i>undulata</i> Fisch. . . . .	5	Steckling ist übersät mit Blumen.	
— <i>veris</i> L. <i>Mazurelliana</i> fl. pl. . . . .	10	<i>Statice Reinwardtii</i> Hort. belg. —	5
— — <i>nanquin</i> fl. pl. . . . .	10	<i>Stauntonia latifolia</i> Wall. (Hol-	
<i>Pultenaea Brownii</i> Benth. . . . .	10	boellia Desn.) . . . .	r — 15
— <i>subumbellata</i> Hook. . . . .	5	<i>Stenochilus viscosus</i> Grah. . . . .	10
— <i>stricta</i> Sims. . . . .	10	<i>Stylidium graminifolium</i> H.	
<i>Punica Granatum</i> L. var. <i>nana</i> . . . . .	5	Belg. . . . .	15
— — — — <i>fl. albopl.</i> . . . .	10	<i>Symphoricarpos racemosus</i>	
<i>Rhodoleia Championi</i> Hook. . . . .	5	Michx. fol. var. . . .	b — 5-20
<i>Rogiera cordata</i> Planch. . . . .	15	<i>Swainsonia coronillaefolia</i>	
<i>Royena lucida</i> L. . . . .	10	Salisb. . . . .	10
<i>Rubus smilacifolius</i> H. Van		<i>Taxus haccata</i> L. fol. varieg. . . . .	10
<i>Houtte</i> . . . . .	r — 10	<i>Thuja occidentalis</i> L. . . . .	b $\frac{1}{2}$ - 2 —
<i>salisburia adiantifolia</i> Sm. . . . .	15	<i>Trachymene lanceolata</i> Spr. . . . .	5
<i>Salvia azurea</i> Lam. . . . .	st f — 5	<i>Tropaeolum azureum</i> Miers <b>kr</b> —	20
— <i>cardinalis</i> H. B. . . . .	f — 5	— <i>hybr. Caroline</i> Schmidt <b>r</b> —	5
— <i>Grahami</i> Benth. . . . .	f — 5	— — <i>Lilly</i> Schmidt. <b>r</b> —	5
— <i>gesneriaeflora</i> h. V. . . . .	f — 5	— <i>lobbianum</i> H. Veitch <b>r</b> —	5
— <i>Houtte</i> . . . . .	f — 5	— <i>pentaphyllum</i> Lam. <b>kr</b> —	10
— <i>ianthina</i> Lk. et Otto <b>f</b> —	5	— <i>hybr. Triomphe de Gand</i>	
— <i>involverata</i> Cav. . . . .	f — 5	<i>Baumann</i> . . . . .	r — 10
— <i>jasminiflora</i> . . . . .	f — 5	Wer irgend mit Aufmerksamkeit ihre Eigen-	
— <i>Lambioni</i> Ker. . . . .	f — 5	heiten belauscht, wird reichen Lohn fin-	
— <i>patens</i> Cav. Benth. <b>fkr</b> —	10	den im feinsten Laub und dem zierlichsten	
— <i>splendens</i> Ker. ( <i>colorans</i>		Blumenfior: nur gönne man den knolligen	
<i>Hort.</i> ) . . . . .	f — 5	Arten ihre Ruhe.	
— — var. <i>violacea</i> . . . . .	f — 5	<i>Trymalium fragrans</i> H. Kew. —	5
— <i>tricolor</i> Hort. . . . .	5	<i>Tussilago Farfara</i> L. fol. var. —	5
Sind sämmtlich eine grosse Zierde unserer Fretlandgruppen.		<i>Ulex europaeus</i> L. . . . .	5
<i>Sansevieria carnea</i> Andr. ( <i>San-</i>		<i>Veronica Andersoni</i> hybr. . . . .	f — 5
<i>seviella</i> Richb.) . . . . .	5	— <i>Dieffenbachii</i> Hort. . . . .	5
<i>Saxe-Gothaea conspicua</i> Lindl. 2-3 —		— <i>formosa</i> R. Br. . . . .	5
<i>Sedum Sieboldii</i> Sweet. . . . .	f — 5	— <i>salicifolia</i> Forst. ( <i>Lind-</i>	
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.		<i>leyana</i> Hort.) . . . . .	— 5-10
<b>st</b> —	5	— <i>speciosa</i> Cunningh. . . . .	5
<i>Senecio Petasites</i> D C. ( <i>Cinera-</i>		— — <i>rubra</i> h. V. <i>Houtte</i> —	5
<i>ria plataniifolia</i> Schrk.) —	10	Dankbare Gattung für's freie Land.	
<i>Serissa foetida</i> Commers. . . . .	10	<i>Viburnum japonicum</i> Spr. . . . .	10
Wer Noth um blühende Myrthe hat, der		— <i>macrocephalum</i> Forst. 5 —	
cultivire diese niedliche <i>Serissa</i> , und sie		Die Grösse der Dolden übertrifft alles	
wird ihm oft mit ihren weissen dacht ge-		Dagewesene in dieser Gattung.	
stellten Blumen aus der Verlegenheit helfen.		— <i>plicatum</i> Thbg. . . . .	2 —
<i>Sibthorpia europaea</i> L. . . . .	5	— <i>Tinus</i> L. . . . .	$\frac{1}{6}$ - 1 —
Zierlichste aller Ampelpflanzen — eine		— — <i>augustum</i> . . . . .	10
wahre Nippischampelpflanze.		<i>Viola arborea</i> fl. pl. Hort. . . . .	3
<i>Siphocampylus bicolor</i> G. Don. —	5	— <i>odorata</i> L. fl. pl. <b>st f</b> —	3
<i>Sollya heterophylla</i> Lindl. <b>r</b> —	5	— <i>pyrolaeifolia</i> Poir. ( <i>lutea</i>	
<i>Sparmannia africana</i> L. . . . .	10	<i>Hort.</i> ) . . . . .	— 15
<i>Spiraea canescens</i> Don. . . . .	e — 10	<i>Weigelia amabilis</i> Planch.	
— <i>prunifolia</i> Sieb. et		<b>st f</b> —	20
<i>Zucc.</i> fl. pl. . . . .	e — 10	— <i>rosea</i> Lindl. . . . .	<b>st f</b> — 10
Wer Zeitungen und namentlich Ausstel-		Einer unserer schönsten Sträucher, hart	
genug, unsere Winter auszuhalten. <i>W. rosea</i>			



	Thlr. Ngr.		Thlr. Ngr.
hielt ohne Decke die härtesten Winter un-		Zephyranthes candida Herb.	z — 5
seres Erzgebirges aus!		— lilacina Liebm.	z — 5
Xanthosia rotundifolia DC.	— 5	Zieria lanceolata RBr.	— 10
Zauschneria californica Prsl.	f — 5	— macrophylla Bonpl.	— 10

## Kalthaus-Sortimentspflanzen.

Die nachstehenden Sortimente enthalten, den Forderungen der Zeit angemessen, das Beste und Neueste, und jährlich werden die als undankbar oder geringer blühenden Varietäten ausrangirt, so dass, wie bei den Tropen, auch der Freund der Caphauspflanzen eine reiche Auswahl findet. Die durch glückliche Vermehrung begünstigte Preiserniedrigung wird, hoffe ich, gerechte Anerkennung finden.

### I. A z a l e a.

Die beigesetzten Preise beziehen sich nur auf stärkere Exemplare; da wo nur frisch-veredelte oder Stecklinge gegeben werden können, kommen 50 0/0 in Abrechnung.

Varietäten von <i>A. indica</i> L.		Ngr.	
	Ngr.		
1. Adolphi fl. pleno V. Houtte	10	32. cuprea superba . . . .	10
2. alba . . . . .	5	33. Danielsjana . . . . .	5
3. — flore pleno . . . .	10	34. — superba Rinz . . .	10
4. — insignis Rinz . . .	10	35. Dawsonii Knight . . .	10
5. — magna de Fraser .	15	36. decora Knight . . . .	10
6. — striata Liebig . . .	10	37. delicata Ivery . . . .	10
7. — triflora Knight . .	10	38. — Van Houtte . . . .	10
8. Alexandriae Verschaffelt	10	39. Diana Knight . . . .	10
9. amarantina Makoy . .	10	40. Duc de Brabant V. Houtte	10
10. amoena Liebig . . . .	10	41. elata . . . . .	10
11. Anais . . . . .	10	42. — plena . . . . .	10
12. Ariadne Liebig . . . .	10	43. electa Liebig . . . .	10
13. augustissima Knight .	10	44. elegans . . . . .	5
14. aurantiaca elegans Knight	10	45. expansa Smith . . . .	15
15. — superba . . . . .	10	46. exquisita Knight . . .	10
16. Aurora Knight . . . .	10	47. flammea Liebig . . . .	10
17. barbata Knight . . . .	10	48. Flora Knight . . . .	10
18. Barou von Hügel Liebig .	10	49. formosa Ivery . . . .	5
19. Beauté d'Europe Demarcq	15	50. — Liebig . . . . .	10
20. blanda Knight . . . .	10	51. formosissima . . . . .	10
21. Calypso Knight . . . .	10	52. Frazeri . . . . .	5
22. carnea floribunda grandiflora	10	53. Friedrich August Liebig .	10
23. carnosa Knight . . . .	10	54. fulgens Knight . . . .	5
24. cerentola Knight . . .	10	55. Gabriele Liebig . . . .	10
25. Cliveana . . . . .	5	56. Gledstanesii . . . . .	10
26. coccinea elegans . . . .	5	57. Glory of Sunninghill . .	15
27. — grandiflora . . . .	5	58. grandidissima . . . . .	5
28. color di lacca Knight .	10	59. Hibbertii . . . . .	5
29. Comte de Flandre . . .	10	60. Hookeri superba . . . .	5
30. Crimson . . . . .	10	61. illustris nova Versch. extra	15
31. cuprea splendens Rinz .	10	62. Isabella Liebig . . . .	10
		63. Königin Marie Liebig . .	10
		64. lactea floribunda Liebig .	10

	Ngr.		Ngr.
65. lateritia . . . . .	10	110. Smiths scarlet pink . . .	5
66. ledifolia flmbriata . . .	5	111. — speciosa . . . . .	5
67. liliiflora . . . . .	5	112. splendida Knight . . .	5
68. Louis Napoleon Versch. .	15	113. striata formosissima Van	
69. macrantha purpurea. . .	10	Houtte . . . . .	10
70. magnifica Knight . . .	10	114. superba venusta . . . .	5
71. magniflora Knight . . .	10	115. Susanna Liebig . . . .	10
72. Mars . . . . .	10	116. Stanleyana Davies . . .	30
73. Melbourne Knight . . .	10	117. Thisbe Liebig . . . . .	10
74. Mignonne Liebig . . . .	10	118. Toinette Dellmotte . . .	10
75. Millneri . . . . .	5	119. tricolor (nec plus ultra) .	10
76. mirabilis Knight . . . .	10	120. variabilis . . . . .	5
77. munda . . . . .	5	121. variegata . . . . .	10
78. mundu'a Knight . . . .	10	122. venusta Liebig . . . . .	10
79. neriiflora rubra . . . . .	5	123. versicolor V. Houtte . . .	10
80. nivea flore pleno Mardner	10	124. vittata Fortunei Fortune .	30
81. notabilis Liebig . . . . .	10	125. — punctata Fortune . .	30
82. ornata Liebig . . . . .	10	126. — rosea Fortune . . . .	30
83. picta . . . . .	5	127. Victor Jacquemont Van	
84. Prima Donna Knight . . .	10	Houtte . . . . .	10
85. Priace Albert Knight . . .	10	128. Azalea amoena Ldl. et	
86. — Camille de Rohan V.		Hook. . . . .	20
Houtte . . . . .	10	129. — crispiiflora Hook. 60-120	
87. — de Joinville V. Houtte	10	Wenn sie nur irgend der mir vorliegenden	
88. — Leopold V. Houtte . . .	10	Abbildung gleicht, so ist sie mit ihren ge-	
89. Prinz Rohan Liebig . . .	10	kräusselten Blumen die prächtvollste aller	
90. princeps . . . . .	10	Azaleen.	
91. purpurea magnifica Knight	10	130. — sinensis Lodd. var.	
92. — superba . . . . .	10	lutea . . . . .	15
93. Queen perfection . . . .	10	131. — — Lodd. var. ver-	
94. refulgens Knight . . . .	10	sicolor . . . . .	15
95. regina . . . . .	5		
96. Reine des Belges . . . .	10	<i>Azalea pontica L.</i>	
97. — de Portugal . . . . .	10	à Stück 20 Ngr.	
98. — Louise V. Houtte . . .	10	132. aestivalis ornata.	
99. rosea pavetta . . . . .	10	133. aurantiaca.	
100. rosca punctata . . . . .	10	134. calendula flammea.	
101. rubra . . . . .	5	135. coccinea major.	
102. Salopensis Knight . . .	10	136. incarnata.	
103. Selima Liebig . . . . .	10	137. jasminoides.	
104. semi-doub'e pink . . . .	10	138. lateritia st. iata.	
105. simmetry Lee . . . . .	20	139. pontica.	
106. Smiths bright pink . . .	5	140. — variabilis.	
107. — coccinea . . . . .	5	141. tricolor.	
108. — fine large pink . . .	5	142. — grandiflora.	
109. — pink . . . . .	5	143. viscocephala.	

## II. Althaea rosea fl. pl.

### Gefüllte Stockrosen oder Malven.

à Stück 1 Thlr.

1. Barke.
2. Berryer.

3. bicolor.
4. carmoisin.

5. Chamois.
6. Comet.
7. Commander en Chief.
8. Crimson King.
9. Derrick.
10. Erd.
11. Gem.
12. — of the Vest.
13. Lady of the Lake.
14. Magnum bonum.

15. Marmion.
16. Mary Jane.
17. Nec plus ultra.
18. Obscura.
19. Ophir.
20. Professor Syme.
21. Queen of England.
22. sulphurea perfecta.
23. Walden Gem.

### III. *Camellia japonica* L. var.

**Abkürzungen:** w. weiss — rt. roth — rs. rosa — dkl. dunkel — reh. reich-, und gg. gutgefüllt — anmb. anemonblüthig — kglb. kugelblüthig — zglf. dachziegelförmig — absch. sehrschön — gr. gross — mt. mit — rglm. regelmässig — grbl. grossblumig — sch. schön — h. hoch. — gest. gestreift — gefl. gefleckt — o. oben — Sp. Spitzen.

Die Preise der ersten Reihe gelten für Pflanzen mit 1—2 Blättern, die der Zweiten für solche mit 3 und mehr Blättern.

	Ngr.	Ngr.
1. Abbate Bianchi, B. Lechi; (Emilie Bandiera.) rt. eine w. Linie in jedem Blatt zglf. . . . .	20	—
2. Abbate Branzini, P. Besson; dichtgef. dachzglf. extra dkl. carm. m. bläulich. Bordüre . . . . .	30	—
3. Adelaide, dkl. weinroth dichtgef. regelm. dachzglf. . . . .	30	—
4. admirabilis, (Maria Luigia di Parma) hscharl. w. gefl. pomponbl. . . . .	10 bis	— 20
5. Adrien Lebrun, (Graulhieri) krschrs. shrsch. zglf. . . . .	10	—
6. Agnesiae, rs. zglf. Form der imbricata . . . . .	10	—
7. alba, reinwss. dchzglförmig . . . . .	—	7
8. — Casoretti, (alba prima) rnw. m. gelb, Sch. . . . .	10	—
9. — fenestrata, (alba nova plena) rnw. zglf. . . . .	10	20
10. — grandiflora, w. kglbl. dicht gefüllt . . . . .	10	20
11. — illustrata, (Waltonensis, Shirvings Seedling) rnwss. zglf. gg. . . . .	7	15
12. — Londonensis, (allnuts alba. candida superba), rw. gedrückt kglblth. . . . .	7	15
13. Alexandre le grand . . . . .	10	20
14. Alexina, Hugh Low et Co; rothw. carm. gefl. gestrf. grbl. regl. . . . .	10	30
15. Allnut superba . . . . .	—	5
16. Alsina d'Italie, shrsch. rs. w. gefl. u. get. zglf. prächtig . . . . .	15	—
17. althaeiflora, (Thunbergiana) zinnob. scharl. anblum. . . . .	—	5
18. amabilis, Smith; (d'Amerique, de New-York) lebhdklr. innen heller shrsch. . . . .	10	20
19. Amalie Croff, Croff; rglm. zglf. wrs. m. rosa gestr. u. punkt. . . . .	15	—
20. Amalthea, lachsfarb. shrgr. . . . .	10	20
21. Amelx de Baye . . . . .	—	5
22. americana Dunlop; rs. fast w. carmin gestr. u. punkt., extraschön . . . . .	30	—
23. anemonaeflora striata, dklkrsch. w. gefl. shrsch. . . . .	10	20
24. Annibal, dkl. krschrth. kugelblüth. . . . .	10	—
25. Apollinea, br. ros. rehgef. zglf. . . . .	10	20
26. Archiduchessa Augusta, Gaetano di Vizo Corsi., (Puccini) dklweintr. m. w. Randstrf. ins blaue spielend; Ränd. dchzglf. schalförm. extra-schön. . . . .	10	30

Archiduchesse Marie, Van Houtte; herrlich dklkirschroth vollkommen dachzglf., in der Mitte eines jeden Blumenblattes			
27.	mit breiten weissen rothgestrichelten Bändern durchzogen . .	30	—
29.	Archinto, carmois schatt. sch. zglf. . . . .	10	—
29.	ardens superba, reinw. gg. . . . .	—	5
30.	Augustina superba, sch. rs. o. m. w. marm. zglf. . . . .	5	—
31.	Aulica, Loddiges; zart. m. w. Rändchen und dkl. Adern .	30	—
32.	Ayez, Casoretti; rosa, glm. rchgef. . . . .	10	15
33.	Baltimoreana, Feasti; w. m. rs. Str. u. Punct. shr. gr. u. sch.	10	20
34.	Barni d'Italie, (non Carswelliana) ponceau wbdstrf. dchzglf. .	15	—
35.	Baronne d'Udekem, Jacob Mokay; lachs. m. w. Mittelstr.	10	20
36.	Bazzoni d'Italie, corallroth, unrglm. gef. . . . .	15	—
37.	Bella di Firenze, Ces. Franchetti; . . . . .	20	—
38.	Bealrosea, Hugh Low et Co., lachsrs. centifolia Bau. extr.	10	20
39.	Belliformis, Mariani; herrl. zglf., mennigeroth . . . . .	30	—
40.	Bellini major, zinnoberth. rosenf. gut gefüllt . . . . .	10	20
41.	Benneyii, Smith; rcarm. unrgm. gestr. zglf. . . . .	10	20
42.	Bergama, gelbls. m. w. Mtlst. w. gerand. Blättern . . . . .	10	—
43.	Bérénice, Mariani; rs. carm. oft weiss gestr. zglf. . . . .	10	—
44.	Bettegno, carm. m. w. gestr. rch. gef. . . . .	10	—
45.	bicolor . . . . .	10	—
46.	Bijou de la Garza, G. Ugoni; (Gioja de la Garza), rsw. und carm. bestrahlt . . . . .	10	15
47.	Bittiniana, (d'Italie) crmrs. inn. fw. Str. sch. zglf. . . . .	15	—
48.	Blackbourniana, dunkelcarm. fast anmbth. . . . .	—	7
49.	Bostonia, grsst. dkl. rth. regelm. zglf. . . . .	10	20
50.	Brillante, Casoretti; (Briantina), w. shr. gr. u. sch. zglf.	10	20
51.	Brocki, kirschroth w. gestrft. zglförm. extrasch. . . . .	10	20
52.	Brooklyniana, carmoth. inn. hell . . . . .	10	—
53.	Brozzoni d'Italie, rosa leicht geadert extraschön . . . . .	30	—
54.	Bruceana, dklkirschroth. pāonienf. . . . .	10	20
55.	Buckliana . . . . .	—	5
56.	Buff, leibfarb. regelm. gef. dchzglf. sehr schön . . . . .	—	10
57.	Camellia de la Reine, J. G. Varenbergh; w. Grund m. leht. Lackglz. zglf. ausgz. geb. . . . .	10	20
58.	Camillo Brozzoni, Cam. Brozzoni; Form d. Duchesse d'Orleans, Pet. d. Peripherie kirschrth. d. and. w. s. sch.	20	—
59.	Campo Molendini, Berlèse; carmin mt. w. Surf., sternf. i. d. Mitte etwas gewirrt, extraschön . . . . .	30	—
60.	candidissima, schneew. zglf. . . . .	5	10
61.	Catharina Longhi, dklcarm. sch. gr. Form . . . . .	10	—
62.	Carl XII. . . . .	10	—
63.	Carbonari, glüh. dklcarm. reiche neue Färbung voll rund pompf.	10	20
64.	Carolinae, sch. w. kglbl. sehrsch. . . . .	—	7
65.	Caroline Smith, Boll.; shrgr. lebh. ros. m. w. Mstr. . . . .	10	20
66.	Carswelliana (Lord Kur), nouveau hlccarm. jed. Petal m. w. Mittelstrf. shrsch. . . . .	7	10
67.	caryophylloides, Hugh Low et Co.; w. lebh. mit carm. gestmmt. und gestrft. vollk. zglf. . . . .	10	—
68.	Cavendishii . . . . .	10	—
69.	Celsiana, dklkirschroth. grbl. regelm. gef. . . . .	—	5
70.	Chandleri, reich dklsharl. oft w. gefl. shrsch. . . . .	—	5
71.	Charlemont . . . . .	—	5
72.	Cliveana, tiefs. fst. anmbth. shr. gr. . . . .	—	5

	Ngr.	Ngr.
73. Clowesianna, (Matrocheti, Fanny Elsler) w. m. wenig rs. Streifen	5	10
74. Cocki vera, (Triomphe de Gand) dkirt. anemf. shr. gr. gutgefüllt	10	20
75. Coelestine, bläulichrs. aussen zglf. innen kglbth. . . . .	10	20
76. Colombo, sch. rs. zglf. . . . .	10	20
77. Colvilli, gr. paeonfs. hellrs. carm. punkt. gestrft. shgr. .	—	5
78. Comerzienrath Linau, Geitner; Beschreibung und Subscriptions-Bedingungen s. den Anhang . . . . .	—	—
79. Commensa, Makoy; dkl. carm. g. rglm. . . . .	10	—
80. composita, lebh. rs. zglf. . . . .	15	30
81. Comte Caraccioli de Italie, rs. grbl. w. gestrft. rglm. voll .	10	15
82. — de Paris, van Geersdaele; wars. mit dkirs. Strf. regelm. . . . .	10	20
83. — de Spaur, weins. schalf. shsch. o. w. Sp. . . . .	20	—
84. Comtesse Allemagne Croff; ws. rglm. I. Rang . . . . .	20	—
85. — de Castelbarco, dklcarm. gefl. o. m. w. Strhl. zglf. shrgef. . . . .	20	—
86. — d'Harug, brennendrth. Strf. regelm. . . . .	15	—
87. — Moncenigo . . . . .	30	—
88. — Ottolini, Ces. Franchetti . . . . .	30	—
89. Concinna, schn. dkirt. zglf. rglm. . . . .	15	—
90. conspicua, Beck; (Imperatrice, latifolia macrantha), rs. dkirt. gead. mit w. Rändchen halbvoll . . . . .	10	20
91. Coquetti, Tourrés, carm. mit weissen Spitzen zglf. . . . .	10	20
92. Crimson Perfection, carm. zglf. sehr schön . . . . .	30	—
93. cruciata, schön carm. meist weiss gefleckt . . . . .	10	20
94. curvatifolia . . . . .	10	—
95. Dahlaeflora, rglm. feurig rt. . . . .	—	5
96. Daniel Webster, Boll; carm. f. w. gestrichelt zglf. extra .	15	—
97. Daviesii, m. dkirt. oft w. gefl. geballt kglbth. . . . .	7	20
98. Daviesii, Davies et Co.; sch. granatroth mit Büsch. deht. gef. zglf. extra . . . . .	10	—
99. Decandollii, lichts. licht. gef. . . . .	—	5
100. decora, rs. purp. shrgr. gg. sehrschön . . . . .	10	—
101. delicatissima, rs. mit carm. Strf. paeonfm. . . . .	—	5
102. decus italicum (Gloire d'Italie) weiss, sehr rund u. sch. zglf. .	20	—
103. Devriana . . . . .	20	—
104. Diadème des fleurs . . . . .	15	—
105. Diva Maria, sch. rs. reglm. . . . .	10	—
106. Divonia d'Italie, blssrs. mit carm. reglm. gestr. zglf. . .	10	—
107. Dobrei, hellicoquelicot, starkgef. kglbthg. . . . .	20	—
108. Docteur Horner, Verschaffelt; prächt. rs. m. w. Mittst. zglf. prachtvoll . . . . .	20	—
109. Donkelaari, dkl. kirschr. sch. w. gefl. fast leer aber sch. .	—	10
110. Don Michel, sch. zglf. rosa nach der Mit. dklr. m. w. Mittstr. extra . . . . .	30	—
111. Dorina Lechi, feur. carm. rosa weiss gefl. und gestr. rglm. .	25	—
112. Dorsetti, (Rex Georgius, Parthoniata); schmutz. rs. lederfarh. anemf. sh. gr. . . . .	—	5
113. Duca Serbellino, B. Lechi; aurora rosa, gross und breit, wie eine Centifolie, prachtvoll . . . . .	15	—
114. Duc de Bretagne, Drouard; (Dux Aemorianus) rosa w. gestr. gg. herrl. dzglf. . . . .	15	—
115. Duc de Litta, Mar.; rs. mt. w. Mittstr. zglf. . . . .	10	—

116.	Duchesse d'Orleans, (Duc d'Orl., Reine de Cam., nobilissima nova, Regina Cam., Reine d'Angleterre, Queen Victoria), fleischf. carm. punct. gestrf. zieglf. . . . .	10	20
117.	Duchesse of Nordhumberland, Lee et Co.; w. rs. gefl. u. glb. sch. zglf. . . . .	15	—
118.	Dryade, hlrs. m. w. Mtstr. sch. zglf. . . . .	15	—
119.	eburnea, w. oft mit roth. Fleck. gr. u. kglbl. gg. . . . .	10	—
120.	Eclipse, Press; (Pressi, Regina Gallicarum), röthl. w. carm. gestrich. kglblüth. . . . .	—	10
121.	elata Chandleri, w. paeonienblt. . . . .	—	15
122.	elegans, violettroth innen weiss gestrich. grosse Büschel, sehr gross und schön . . . . .	—	7
123.	Elphinstoni, dklkirschroth rglm. gef. sehr schön . . . . .	—	10
124.	Emilia Campioni, Abbate Bianchi; carmrth. in blehrth. übergehend mt. brt. wrth. gead. Mittelstrf. . . . .	15	—
125.	— Gavazzi d'Italie, sch. rs. gefl. und gestrf. dchzglf. . . . .	10	20
126.	— grandiflora, schrs. m. wenig w. Fleck. kglbl. . . . .	10	20
127.	— Taverna, scharl. mt. w. Centr. zglf. gg. . . . .	10	20
128.	Empereur de Russie, sch. rth. Mt. w. gestr. dchzglf. . . . .	20	—
129.	Emperor Alexander, Slaone; dklrosa, vorzügl. zglf. extra . . . . .	20	—
130.	Enrico Bettoni, B. Lechi; crms. m. einem Krz. gewirrt. Blt. eigenth. Form . . . . .	10	20
131.	Estheri, Smith; blassfleischfb. m. rs. Fleck u. Punct. kglbl. shrgr. gg. . . . .	10	20
132.	excelsa, (Rollissoni), w. unregelm. . . . .	10	—
133.	eximia, corallcarm. zglf. . . . .	—	10
134.	fastuosa, aus Italien, dklrs. shr. grbl. zglf. . . . .	10	—
135.	Faustine Lechi, zrtrs. w. gtscht. dkl. o. lehrth. gstr. u. gefl. kbl. . . . .	10	—
136.	Feasti, ext. w. rs. gestr. shr. zg. . . . .	10	—
137.	felicitas, lbhrs. pomponf. . . . .	10	20
138.	fimbriata alba, rnw. m. gefranzt. Blättern, sehr schön . . . . .	10	20
139.	florida, (Henriette, anemonaefl. micans, Princeps), dppl. anm. . . . .	—	5
140.	Floy's Virginia, kirschrosa f. gef. zglf. sehr grbl. . . . .	10	30
141.	Forbesii, Hugh Low u. Comp.; lebh. kirschrth. zglf. . . . .	10	—
142.	formosa (angulans, Anglarsi), rs. carm. mit zinnob. gedrängt monströs . . . . .	10	20
143.	— Youngii, rth. rglm. Blt. . . . .	10	—
144.	Forsteri . . . . .	10	—
145.	Francofurtensis (Wellingtonii, dark fulgens), bräunl. carm. fast zglf. . . . .	—	5
146.	Fra Arnoldo di Brescia, B. Lechi; gr. Bl. pr. Atlasrosafarb. m. w. rs. marmorirten Bändern, prachtvoll . . . . .	30	—
147.	Frédéric le grand (Floy, grand Fréd.), rs. carm. shr. grbl. . . . .	10	20
148.	Frezzolini, Mariani; sch. lebh. rs. zglf. . . . .	10	—
149.	fulgens, zinnob. carm. pomp. bl. sehr schön . . . . .	—	15
150.	— nova, lbh. rth. j. Bl. w. Lin. zglf. . . . .	15	—
151.	Garibaldi, B. Lechi; rosa dkl. gead. innere Pet. gestreift . . . . .	15	20
152.	Garveyi (Garviana); blass rs. m. carm. gefl. u. punct. kglblth. sehr schön . . . . .	15	—
153.	General Lafayette, Boll; rosa mt. w. Mittelstrf. auf jeder Bl. rglm. m. umgeschl. licht Rändern . . . . .	10	30
154.	Ghittiana . . . . .	—	15

	Ngr.	Ngr.
155. Ghittiniana . . . . .	10	—
156. Gloria de la Isole Borrome, Rovelli frères; inn. rs. rthgef. u. w. gestrf. zglf. . . . .	10	—
157. Gloria del Verbano Rovelli frères; carminrosa m. w. Mtlstr. rglm. zglf. prachtvoll . . . . .	30	—
158. gloriosa . . . . .	—	5
159. Governativa aus Italien, dunkelscharl. zglf. extrsch. . . . .	10	20
160. Gozzi aus Italien, zartrs. hell geränd. schgeformt. zglf. . . . .	10	20
161. Graf Wartemberg . . . . .	—	5
162. grande Duchesse d'Etruria, w. rs. dklrsgestr. paeonienbl. . . . .	10	30
163. grandidissima superba, dklisch. roth rglm. gef. gz. prachtvoll . . . . .	—	7
164. grandis, Hugh Low et Co.; hlklrschrth. dklrth. gestr. äuss. Pet. zglf. w. gebändert Bl. 4" gross . . . . .	15	—
165. Grand Napoleon, Marchese Ridolphi; gr. rothe Bl. mit kl. w. Spitzch. und dunkeln Adern . . . . .	30	—
166. Grand Sultan, brill. hochscharl. shr. gr. w. gemusch. vollk. zglf. . . . .	20	—
167. Gretry, Defresne; sch. carm. extra zglf. . . . .	20	—
168. Guillaume Tell, Boli; auss. lebh. rs. inn. zrtr. jed. Bltt. mt. w. Rand . . . . .	20	—
169. Gussonia . . . . .	—	15
170. Guthriana, Hugh Low et Co.; dklcarm. zglf. prachtvoll . . . . .	10	—
171. Haileyi, Hailey; blrth. m. w. Mtlstr. extra sch. . . . .	15	—
172. Hannah Moore, dkl. carmois. mit br. weiss. Flk. . . . .	10	30
173. Harlequin, C. Borghi . . . . .	60	—
174. Helene . . . . .	—	15
175. Hendersonii, (Lombardii, pictorum rosea) sch. rs. olt mit w. Flecken ziegelf. sch. . . . .	10	20
176. Henri Favre, lachs. in der Mitte heller, schalenf. sch. . . . .	10	30
177. heptangularis, licht kirschroth zglf. extrasch. . . . .	—	7
178. heteropetala rubra, shr. sch. schatt. hlb. pompon. zglf. . . . .	10	—
179. Hillare rosea nova, schön rosa gef. dchzglf. extra schön . . . . .	20	—
180. Hosackii, Floy . . . . .	10	—
181. ignescens . . . . .	—	5
182. Il Cygno, w. durchscheinend gead. m. glbl. Mtlstrf. . . . .	10	—
183. Il 22 Marzo, M. Burdin; krschrth. w. gerand. u. w. Mtlstr. rosenförm. extra . . . . .	20	—
184. imbricata, Dunlop; (imbr. tricolor, trnc. Youngs) rglm. rs. carm. oft w. Fl. sch. . . . .	10	20
185. Imperatrice de Russie . . . . .	10	—
186. incarnata, (Lady Humesblush, Ruff, lutescens, Maidenblush, flavescens), geröth. w. zglf. . . . .	—	5
187. Innocenza, rnw. gr. shr. sch. zglf. . . . .	10	—
188. Insubria aus Italien, (l'Insubria) rs. w. gest. mtlgrs. zglf. gg. . . . .	10	30
189. Jacksonii, Verschaffelt; lth. dkscharl. m. w. Mtlstr. sch. gewölbt zgl. ext. . . . .	30	—
190. Jardin d'hiver. Jardin d'hiver; dklrth. Mitt. ros. grss. zglf. . . . .	15	—
191. Jaune de la Chine, Fortune . . . . .	30	—
192. Jeffersonii, Gunnell; herrliches roth, prächt. dchzglf. bisweilen weisser Mtlstr. prachtvoll . . . . .	30	—
193. Jubilee, Hugh Low et Co.; w. od. fleischf. schön zglf. . . . .	30	—
194. Juliana, (Calypso, Tweediana superba, Climax, Comte Rambaldi), w. rs. wen. gst. sch. . . . .	10	30
195. Jupiter, Smith; carm. m. reglm. w. Bandstr. zglf. . . . .	30	—

	Ngr.	Ngr.
196. Jussieu, Jussiana; carm. rs. shr. sch. rglm. . . . .	10	—
197. King, (spectabilis maculata, Clusil, Linkii.) w. sahnfrb. schimmernd rs. Str. u. Punkt. . . . .	10	—
198. Kissi . . . . .	—	7
199. Lady Eleonora Campbell, hell-scharlach lehtgf. . . . .	—	7
200. — Hill, w. carm. gefl. und gestr. kgibl. extr. . . . .	10	—
201. Landrethii, Jacksonii; Liebl. rs. regelm. extrasch. . . . .	—	20
202. latifolia macrantha, hlfrs. pomponbl. . . . .	—	15
203. La Previdenza, lebh. roth jed. Bl. mit w. Mittelstr. zglf. . . . .	30	—
204. Leana superba, (cocc. magna, Palmers Beali, Sieboldtii), lachsarb. inn. rs. oft w. auss. dklrth. extrasch. . . . .	25	—
205. Lechiana nova aus Italien, hellweinfarb. zglf. gr. Bl. . . . .	10	20
206. Leda aus Italien, w. scharlach gestrft. extrasch. . . . .	10	30
207. Leonardi, leicht rs. lachsf. anemtbl. . . . .	10	—
208. Leopoldine d'Italie, (Princesse Leopoldine) rthlw. rth. gest. u. punct. fst. rglm. . . . .	10	—
209. Lefébriana, dklcarminrosa fast zglf. Mitte gewirrt . . . . .	15	—
210. Lippoldi . . . . .	15	—
211. Lombarda, Mariani; in der Art der Duch. d'Orleans, rosa . . . . .	30	—
212. Lord Peel, Alex. Verschffd.; hlkschrth. Mitt. m. w. R. zgl. . . . .	20	—
213. Lovely rose. . . . .	—	15
214. Lowii, Hugh Low et Co.; neu lachrs. m. w. Mittstr. sch. rglm. zglf. . . . .	15	30
215. Mackoyi, (Low's Macesto); dkrt. in rosa schimmernd . . . . .	10	30
216. maculata superba, w. rs. gestr. kgiblth. . . . .	15	—
217. Madonna, w. m. carm. gestr. zglf. . . . .	10	—
218. Magdalena, hlrrth. m. w. Str. n. Ränd. rosenförmig . . . . .	20	—
219. magnificent, C. Borghi . . . . .	40	—
220. Mahomet, (Maometto); sehr dklrth. gross rglm. extra schön . . . . .	20	—
221. Manzoni . . . . .	10	—
222. Marchioness of Exeter, Priaulx; grsst. zartrs. ziegelförm. . . . .	10	20
223. Marguerite Lechi, B. Lechi . . . . .	30	—
224. Margueritta Gouillon, sehr sch. zglf. rosa rs. bandirt und gestr. prachtvoll . . . . .	30	—
225. Marianne Trivulgia, M. Trivulgio; w. m. carmoisin gestr. u. gefl. zglf. stark gefüllt, prachtvoll . . . . .	30	—
226. Maria Theresia, gliblig. rs. m. dkl. carm. P. u. Fl. gewölbt zglf. shrach. . . . .	20	—
227. Mathotiana, Mathot; schönste u. grösste rglm. zglf. Blume scharlach m. rosa Reflex prachtvoll . . . . .	25	—
228. Mazeppa, Mariani; reh. kirschrth. shr. gr. zglf. . . . .	30	—
229. Mazuchelli, hellcarm. mit w. Strf. zglf. extrasch. . . . .	15	30
230. Medicea, f. carm. scharl. pompblth. oft regelmässig . . . . .	—	15
231. — Casoretti; fa. carm. scharl. oft regelm. pomp. sehr schön . . . . .	15	—
232. Meneghini, carm. rglm. w. gestr. sehr schön . . . . .	15	—
233. mexicana nova, C. Borghi . . . . .	30	—
234. miniata, Hugh Low et Co., scharl. m. w. Herz ros. und zglf. ext. sch. . . . .	10	30
235. minuta, Hugh Low et Co.; bläulrs. oft gestr. shr. sch. zglf. . . . .	10	20
236. Miranda rosea, prcht. rs. zgf. . . . .	20	—
237. Monarch, Halley; dkl. lachsfm. w. panaschirt, schön, kugelbl. . . . .	20	—
238. Monetti, metallglänz. carm. m. dkl. Lin. fast rglm. zglf. . . . .	20	—
239. Monteroni vera, gelbl. w. rs. gestr., zglf. extr. sch. u. gr. . . . .	20	—



Ngr. Ngr.

240.	Mrs. Abby Wilder, Marschall Wilder; w. selten rosa Strich, gr. shrsch. regl. zglf. . . . .	15	30
241.	Murrayana vera, carm. schrl. zglf. shrgr. . . . .	10	20
242.	myrtifolia alba, Herbert; (Schachkönigin, albicans, Princesse Royale), dkl. kl. rs. spitzblütrg. Bl. zglf. . . . .	10	15
243.	Napoleon, Defresne carm. zglf. . . . .	15	—
244.	Nassiana, hellcarm. m. wss. Streif. zglfm. . . . .	10	20
245.	Negri aus Italien, zglf. fast rein w. m. wenig rosa Strich u. Punkt. . . . .	15	—
246.	Nerone. Paillet; hchscharl. ins bläul. spiel. Rändchen shrsch. . . . .	15	—
247.	Nicholsii (Susanne, pictorum striata) lachsrt. m. w. gefl. licht. gef. sehr sch. . . . .	15	—
248.	nitida, Chandler; hellscharl. m. w. Rdstr. zglf. exursch. . . . .	15	30
249.	Normanni, Ambr. Verschaffelt; $3\frac{1}{2}$ " gross, ausgez. schön rosa zglf. Blume n. d. Rande heller, oft w. schattirt. . . . .	40	—
250.	nymphaeaeifolia, lbh. kirschrth. i. rs. sch. zglf. . . . .	15	—
251.	ochroleuca, w. m. gelb. Schimm. fast. zglf. st. u. gg. . . . .	10	20
252.	Onore de Pippiani, Ridolfi; w. mt carmin gest. zglf. . . . .	20	—
253.	optima, Hugh Low et Co.; lebh. rosa mt. carm. Strf. sch. gr. zglf. prachtvoll. . . . .	30	—
254.	Orphio, (Orfeo), carm. hll. Mittelstreif. regelm. shrsch. . . . .	15	—
255.	Oxonienis, (mutabilis maculata amplipetala) flattrig zart hlrs. grsbltr. lg. . . . .	10	20
256.	Parini, Casoretti; w. m. glb. Schim. st. rt. Strf. paeonf. sch. . . . .	7	10
257.	Parmentieri grandiflora, Smith; rs. ins kirschrth. rgfm. get. . . . .	—	5
258.	Paul und Virginie, Grüneberg; w. rs. shrsch. . . . .	20	30
259.	Pawlikowsky, Grüneberg; sch. rs. zglf. shrschön. . . . .	7	15
260.	Pensylvanica, (Longstreathii), lebh. rt. m. rs. Sch. und brt. w. Mtstr. sch. zglf. . . . .	20	—
261.	Percevalii, Hippert; dklroth. unregelmässig . . . . .	10	20
262.	peregrina, w. carm. gestr. wie eine Nelke shrsch. . . . .	—	15
263.	perfecta, Chalmers; bald hell, bald dkl. gstr. w. gef. präch. zglf. . . . .	10	20
264.	Perfection, Cunningham . . . . .	10	—
265.	— Palmer; (Palmer's Bealy, Palm. Cavendishii, Palm. Seedling, Theophiliana striatiflora) prcht. carm. sch. zglf. . . . .	10	—
266.	Perpenti d'Italie, rs. w. gefl. ziegelförmig . . . . .	15	—
267.	picta grandiflora, Comte Carracioli; wssl. rs. dkt. und kschrth. gestrf. . . . .	30	—
268.	pictorum coccinea, Jamma; dkl. scharl. zglf. grossbl. . . . .	10	20
269.	Pio IX., Milan; carm. nach d. Mitte rs. u. w. auslauf. sternf. extr. . . . .	10	—
270.	Pisani d'Italie, weiss, rosa od. carm. getuscht u. liniirt, shr. gflit. zglfm. . . . .	20	—
271.	Pius IX., Mariani; dklrosa, i. d. Mitte m. w. Streifsch., extragross, zglf. etwas spitzblättrig, präch. . . . .	25	—
272.	platypetala, durchschein. rthl. w. rtgestr. flach paeonf. shrsch. . . . .	—	7
273.	pomponia, w. paeonbl. grbl. . . . .	—	7
274.	Pouhatan Floy; dkl. scharlach, gross und reichblühend, kugelbl. s. schön. . . . .	20	—
275.	praeclara, sch. lebh. rs. zglf. . . . .	10	—
276.	Pratti, Buist; hlrs. jedes Blatt mit w. Mittelstrf. gr. gg. zglf. prachtvoll. . . . .	10	20
277.	Preston's Eclipse, rs. kglbl. sch. . . . .	—	10
278.	princeps . . . . .	—	7

		Ngr.	Ngr.
279.	Prince Albert, Chandler and Sons; (Albertus), hlrs. carm. punct. kgibl, shrsch. . . . .	10	—
280.	Princoesse Bachiochi, J. Boffi; dklzglrth. m. w. Mittelstrf. zglf. rglm. shrsch. . . . .	10	20
281.	— Charlotte, w. u. rs. ins gelbl, spielende Bl. sch. rs. Bau extra . . . . .	30	—
282.	— Maria, V. Houtte; lachsrs. mit w. Mittelstrf. . . . .	—	10
283.	— Mathilde, March. Spini . . . . .	20	—
284.	Princess Royal, Hugh Low et Co; dklrs, auss. zglf. inn. gewirrt shrsch. . . . .	10	—
285.	Principe di Salerno, Gullino . . . . .	30	—
286.	— Doria, B. Lechi; dklblutroth, prachtvoll . . . . .	30	—
287.	Principessa Maria Pia, Besson; lebh. ros. m. wss. Bord. und gestr. extra . . . . .	30	—
288.	Pronayana . . . . .	10	—
289.	pulchella, hchrs. kgibl. ggf. prachtvoll . . . . .	10	20
290.	punctata, (Gray's invincible, Imperialis splendida), rs. gestr. punct. gr. paeonf. . . . .	—	7
291.	Queen of Danemark, Hugh Low et Co., leucht. kirschrth. rw. gestr. spärl. zartrosa m. wss. Bordüre . . . . .	30	—
292.	— of England, ztrrs. rglm. w. Strf. auf jed. Bltt. zglf. extra schön . . . . .	10	20
293.	— — Fiedler; (Queen of great Britain) rs. jed. Bltt. m. w. Mttlstrf. sch. zieglf. . . . .	10	20
294.	— Victoria, Priestley; shrsch. dklrth. m. w. Mttlstr. . . . .	10	—
295.	radiata, (Marchese Ridolfi); rs. m. dkl. Ad. shrsch. zglf. . . . .	20	—
296.	Rappalino aus Italien, sehr schön. lebh. rosacarmin, in jed. Bl. w. Mittelstr. vorzügl. zglf. . . . .	45	—
297.	Ravesiana (Futtung, speciosa, Bozeana, Parksii vera, Palmers striped, Waratah, Palm.carnea), dkl.corallr. monst. anmbt.grssbl. . . . .	7	15
298.	Reevesiana, (Angresciae Reevesiana, amoena, Rossi vera, Reyn- dersii rosaefl.) dppl. anmbt. hllscharl. dklrs, zglf. halb. gef. gr. Blüth. . . . .	—	7
299.	Reine des fleurs, Donkelaar; dklcarminrth. oft m. w. band. . . . .	10	30
300.	Ristorii aus Italien, dklfleischrosa mit breiten w. Bänd. u. Streif. sehr schön. . . . .	30	—
301.	Robertsoni, leucht. dklcharl. rglm. und gross . . . . .	10	20
302.	Roi Leopold, Defresne . . . . .	30	—
303.	Rollinsoniana, rosa . . . . .	15	—
304.	Romanensis, Mariani; w. m. glbl. Sch. u. rth. Strf. u. Fl. zglf. und gross . . . . .	—	20
305.	rosea perfecta nova, prächt. rosa . . . . .	15	—
306.	— plena, rsrt. rglm. gebt. gutgefüllt . . . . .	—	5
307.	Rose de la Chine . . . . .	—	15
308.	Rothschildiana, Hugh Low et Co.; sch. gr. gg. fleischf. m. w. Str. dachzglf. . . . .	15	—
309.	rubescens, Hugh Low et Co.; lachsrt. w. lin. rund Bltt. rglm. . . . .	10	—
310.	rubra plena, dklrt. rglm. gef. . . . .	—	5
311.	Saccoi, aus Italien, (color di lacca) shrsch. blasserosa zglf. . . . .	10	20
312.	— nova, (Alfida, Alcina, Augustina superba etc.) shrsch. rs. vorz. zglf. extr. sch. . . . .	15	—
313.	Smailoff, bltrth. braun geäd. mt. w. Mttlstr. . . . .	10	—
314.	Schiavone, (Zavoni, il Roberti), rs. mt. w. Mttlstr. zglf. . . . .	10	—
315.	sericea striata, schrs m. rglm. w. Mttlstr. dchzgl. prachtv. . . . .	30	—

	Ngr.	Ngr.
316. Serra, ganz blassrosa dkl. gestr. u. punkt. shrsch. kugelbl.	20	—
317. Sherwoodii, Sherwood; lbh. krschrth. w. gestr. zglf. . . . .	15	—
318. Soulangiana plenissima, d'Italie, carm. rs. rgln. . . . .	15	—
319. Sovereign, Hugh Low et Co.; w. m. carmin gefl. zglf. 4" gr.	15	—
320. spiralis nova, Ital., carmscharl. mit w. Str. zglf. . . . .	10	30
321. splendens, . . . . .	—	10
322. Spofforthiana vera, w. fein carm. gestreift . . . . .	—	15
323. squamosa, carm. m. kl. Schatt. zglf. oft w. eingef. . . . .	10	20
324. Strombio. Ital., weinrt.gebl. gg. . . . .	10	—
325. Suglio. (Sorvi). scharl. ins rosa, zglf. (einen Stern bildend)	15	—
326. sulcata, (Belle Irène) w. gi. Bl. mt. w. Mittstr. zglf. . . . .	—	15
327. Sweetii, zartrosa rth. punct. u. gestr. kgbl. . . . .	10	20
328. symmetrica, neu rosa zglfm. Musterbl. . . . .	10	—
329. Teutonia, Grüneberg: (Victoria and Albert,) oft rs. oft w. oft gestr. an derselb. Pfl. zglf. . . . .	10	30
330. Theresa Marchesa d'Ambr., auss. rs. inn. dklis. geäd. zglf.	30	—
331. Theresiana . . . . .	15	—
332. Thomasini, Thomasii d'Italie, weinrosa oft w. gefl. zglf. . . . .	15	—
333. Thompson superba, zinnbr. carm. rd. dcht. pomp. b'ith. . . . .	15	—
334. Torinelli d'Italie, prächtig rosa, eine Centifolie . . . . .	25	—
335. Traversi plenissima, (mut. Traversi), rscarm. wssl. geränd. gebänd. zglf. shrsch. . . . .	10	20
336. tricolor, Grund w. breit carm. gefl. hlbgef. . . . .	—	15
337. triumphans, (triumphans de Gand), shr.gr.h.brltr.rs.kgbl.vorzgl.	—	15
338. triomphe de Milan, w. lebh. rth. gestr., gross u. extra sch.	—	20
339. Tsubacki . . . . .	15	—
340. Vandesiana carnea, dklachsf. sh. rgln. zglf. . . . .	15	—
341. — superba, hochkirschroth brennend rgln. gef. . . . .	—	5
342. Van Houttei . . . . .	10	20
343. variegata plena, lichtrs. mit w. Fleck, leicht gef. . . . .	—	5
344. — superba . . . . .	—	15
345. Venera, lbh. carm. extr. oft w. Str. sch. zglf. . . . .	10	—
346. venosa, (Theresiana, Pomp. gris. paeonifl. aurea), wssl. rsf. m. rth. Adern durchzgen. . . . .	10	20
347. Verger, zartrosa, zglf. Mitte gewirrt. . . . .	20	—
348. Verschaffeltiana, Alex. Verschaffelt; lbh. rosa mit w. Mittstr. extr. rgl. sch. zglf. . . . .	15	—
349. Vexillo di Flora, rs. zgl. shr. gr. . . . .	10	30
350. Victoria Antwerpensis, milchw. mit dklrt, leicht gestrich fast zglf. sehr schön . . . . .	10	30
351. — Magnesii, rosa mit breiten w. Mittelstr. zglf. . . . .	30	—
352. villageoise rthlw. m. rth. punct. . . . .	—	15
353. violacea superba, (exuberans), sch. carm. gg. kgbl. shrsch.	10	20
354. Visiano d'Italie, feuerroth . . . . .	15	—
355. Waadii, Amerika. milchw. fast ziegelf. schön . . . . .	10	20
356. Wallichii, rosa m. w. gefl. kugelbl. sehr schön . . . . .	15	—
357. Warattah . . . . .	—	7
358. Welbanki, milchw. unrgln. gef. grsbl. . . . .	—	7
359. Weymourii, w. mit röthl. Anflug anemb. grossbl. . . . .	—	7
360. Wilbrahami, hell, rs. fast paeonf. kgbl. gg. . . . .	—	7
361. Wilderi, (Marshall Wilder), herrlich zarts. rgln. zglf. . . . .	15	30
362. Woodsii, sch. rs. shr. gr. gg. . . . .	—	7
363. Youngs reed. sch. w. shr. grsbl. rgln. zglf. prachtvollst. w.	—	10
364. Zephyr (il Zeffiro). shr. sch. carm. zglf. . . . .	10	—

- Ngr. Ngr.
365. *Camellia reticulata* Lindl.; rsf. hlbgef. grbl. . . . . — 10
366. — *Sasanqua*, Thbg. (maliflora hort.), rs. gg. kleinbl.  
paeonförm. . . . . — 10

#### IV. *Chrysanthemum indicum* Thbg. var.

Starke Stecklinge à 2½ Ngr., starke Büsche à 5 Ngr.

- |                             |                             |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. alveoliflorum Lebois.    | 16. General Carrelet Ferr.  | 34. Paquerette Lebois.         |
| 2. Aramis Lebois.           | 17. Horatius.               | 35. Perle d'automne. Ferr.     |
| 3. Astrubal.                | 18. Jason Lebois.           | 36. Petit Poucet B.            |
| 4. Attala Lebois.           | 19. Julie Langlade.         | 37. Pompon d'or.               |
| 5. Augustinus.              | 20. La Laponue Bonam.       | 38. — toulousain.              |
| 6. Avocat Tardif Ferrand.   | 21. La Liliputienne B.      | 39. Protée Lebois.             |
| 7. Belle d'août.            | 22. Lartey.                 | 40. Regulus.                   |
| 8. Berryer Ferr.            | 23. Le Nain Bébé Bonn.      | 41. Rose d'amour.              |
| 9. Colibri Ferr.            | 24. Louis Chaix Ferr.       | 42. Rosine Ferr.               |
| 10. Comte de Chambord Ferr. | 25. Madame Chauvière.       | 43. Souvenir de Claudine Ferr. |
| 11. Daglide.                | 26. — Heine.                | 44. — Roquancourt.             |
| 12. Dame blanche. Lebois.   | 27. — Julie de Lory Lebois. | 45. Sidonie Bonn.              |
| 13. Dejanire.               | 28. — Schmitt Ferr.         | 46. Trianon Ferr.              |
| 14. Etoile du matin Ferr.   | 29. M. A. Pascal Ferr.      | 47. Triomphe de Bordeaux.      |
| 15. Française.              | 30. M. J. Philopal Ferr.    | 48. Vacite Lebois.             |
|                             | 31. multiflora.             | 49. Zephir Lebois.             |
|                             | 32. Nelly.                  |                                |
|                             | 33. Orion.                  |                                |

#### V. *Cinerarien*.

à Stück 10 Ngr.

- |                                    |                             |                              |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Blue heard surpassed Henderson. | 5. Effie Deans Hndrs.       | 10. Marianne Hndrs.          |
| 2. Blueperfection lvery.           | 6. Formosa Hndrsn.          | 11. M. Sidney Herbert.       |
| 3. Carminata Hnders.               | 7. Georgiana Hndrs.         | 12. Prometheus Hndrs.        |
| 4. Charlotte Crisi Henderson.      | 8. Hammersmith Beauty.      | 13. Queen of Beauties Smith. |
|                                    | 9. Lady Gertrude Henderson. | 14. Vikar of Wakefield.      |

#### VI. *Fuchsien*.

Von den älteren grossblumigen, von fleischfarbigen bis zum feurigsten Roth, können noch circa 50 der besten Sorten, stark à 2½ Ngr. abgegeben werden; und eignen sich im Sommer am besten zu Gruppen in's freie Land.

##### *Species.*

à Stück 5 Ngr.

1. corymbiflora R. P.
2. fulgens Moc. Sess.
3. macrantha Hook.
38. miniata Linden.
4. nigricans Linden.
5. serratifolia R. P.
6. spectabilis Hook.
7. splendens Zucc.

- |                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 8. syringaeiflora Lem.        | Ch. |
| 9. venusta H. B. K.           |     |
| 39a. miniata Planch. et Lind. |     |

##### *Varietäten und Hybriden.*

à Stück 3 Ngr.

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 10. Cassandra.        | 12. corymbiflora alba Salter. |
| 11. Confidence Hndrs. | 13. delicata.                 |
|                       | 14. Don Giovanni Henderson.   |
|                       | 15. Dr. Jephson.              |
|                       | 16. Duchesse of Montpensier.  |
|                       | 17. Fontaine.                 |
|                       | 18. Foy of Bäteracht.         |
|                       | 19. General Changarnier.      |

- |                                       |                                      |                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 20. General Oudinot.                  | 43. Aspasia Pince.                   | 72. Inaccessible Kumberlay.      |
| 21. globosa alba grandiflora Kendall. | 44. Atkinsonii.                      | 73. Julie Grisi Miellez.         |
| 22. Great Britain Dickson.            | 45. atrosanguinea Salter.            | 74. linifolia.                   |
| 23. Kossuth.                          | 46. Auguste Kares.                   | 75. Madame Tranchant.            |
| 24. Lady of the Lake.                 | 47. Beauty of Chelmsford Turvill.    | 76. magnificens Dood.            |
| 25. magnifica.                        | 48. — — Dalston.                     | 77. Mazeppa.                     |
| 26. Miss Fry.                         | 49. — — Devons-hire.                 | 78. Musostica.                   |
| 27. Mlle. Cardoville.                 | 50. Bride Magle.                     | 79. Newtoniensis.                |
| 28. Minerva superba.                  | 51. Clapton Hero Batten              | 80. Paragron.                    |
| 29. Napoleon Dubas.                   | 52. Diadem Magle.                    | 81. Perfection Miellez.          |
| 30. nobilissima.                      | 53. Dr. Grosse.                      | 82. Pius IX.                     |
| 31. Nonpareil Dubas.                  | 54. Duchesse of Lancaster Stirzaker. | 83. Premier Henders.             |
| 32. Präsident Porcher Miellez.        | 55. Eclipse Miellez.                 | 84. Purple Perfection Henderson. |
| 33. Princesse Alice.                  | 56. elegantissima Veitch.            | 98. reflexa.                     |
| 34. Roi de Rome.                      | 57. Elisabeth Kendall.               | 85. Roi des Fuchsia's Miellez.   |
| 35. Rosa Gerlach.                     | 58. Emilie Miellez.                  | 86. scarletina reflexa Sheriff.  |
| 36. serratifolia multiflora.          | 59. Emperor Kendall.                 | 87. Sir J. Paxton.               |
| 37. Venus Victrix.                    | 60. Fair Rosamond Henderson.         | 88. Souvenir de la Reine Coene.  |
|                                       | 61. Fantome.                         | 89. splendidissima Henderson.    |
|                                       | 62. flavesces Miellez.               | 90. The Pearl of England Wenige. |
|                                       | 63. Gay lad Gaynes.                  | 91. Tom Miellez.                 |
|                                       | 64. General Negrier.                 | 92. Van Dyk Miellez.             |
|                                       | 65. gigantea Smith.                  | 93. variegata superba.           |
|                                       | 66. Globe of Perfection.             | 94. Vauban Miellez.              |
|                                       | 67. globosa perfecta.                | 95. Verrio Turner.               |
|                                       | 68. Glory Banks.                     | 96. Victor Hugo.                 |
|                                       | 69. Graf zur Lippe.                  |                                  |
|                                       | 70. Grand Sultan.                    |                                  |
|                                       | 71. Hendersoni Hndrs.                |                                  |

*Neuere und neueste  
Hybriden und Varietäten.*

à 5 Ngr.

- 39b. admirable Gaynes.  
40. Agnes (gefüllt)  
41. Albina.  
97. Amalie Louise Wenige.  
42. Ambroise de Jonghe

**VII. Georginen, nach Farben eingetheilt.**

Nachstehendes Sortiment unterlag einer so genauen Sichtung, dass — wie sonst gebräuchlich — die Rangbezeichnung wegfällt. Alle hier aufgenommenen Georginen sind Rangblumen 1. Grades und kosten à Stück 5 Ngr.

*Rein weiss.*

1. Hebe, Deegen; rnst. w. vollk. kglf.
2. Kant, D.; übertrifft alle bis jetzt bekannten weissen.
3. Schneerose, D.
4. Ulrike, Gräfin von Klebelsberg, D.

*Weiss und bandirt.*

5. Amalie Winter, D.; mit Purpur übertuscht.
6. Belle St. Laurent, Haquin; milchweiss m. violett sch. umtuscht, Sp.
7. Citronenvogel, S.; feurig rein citronengelb, schönste Lilliput.
8. Fantasie, Rinz; w. mit gelbrth. Rand.
9. Fee vom Elsterthal, S.; milchweiss m. feinen violetten Strichen.
10. Gellert, D.; milchweiss m. feinen blauen Spitzen, Prachtblume.
11. Gräfin von Brandhof, D.; weiss mit bläulichen Spitzen.

12. Juno, Girl.; aussen carminf.
13. Madame Dresser, D.; mit carminrand und weissen Spitzen.
14. — v. Geert, Siekmann; m. dkl. lilla rs.
15. — Stritter, m. blasslilla Spitzen.
16. Meyerbeer, D.; blass hautfarben.
17. Miss Vysi, Turner; w. m. violettbl. Spitzen.
18. Monseigneur Picy, m. rs. Schein.
19. Princesse Radziville, Gaine; milchw. m. violett carm. Spitzen.
20. Prinz de Siege, mit violetten Spitzen.
21. Psyche, Voisinon; weiss mit rosa.
22. Staar, Bragge; milchw. m. rosapurp. glf.
23. striata multiflora, S.; w. hellviolettband u. gestrichelt, die schönste bunt.

### *Gelb.*

24. Cleopatra, Attwell; rein schwefelgelb.
25. Duchesse of St. Alban, helleitrongelb.
26. Ferdinand I., D.; leuchtend citrongelb.
27. Klopstock, D.; prcht. citrongelb extra.
28. Königin von Elsterthal, S., köstlich schwefelgelb.
29. Première de Voisenon, dunkel isabellfarbig.
30. Sophie Boffinet, goldfarbig.
31. Therese Freifrau v. Villa Secca, S.; schönstes schwefelgelb.
32. Anacreon, Du bras; goldgelb mit roth umtuschten Spitzen.

### *Gelb mit bunter Färbung.*

33. Bunter Arras, S.; blssglb. mit hell und dkl. carm. Rand u. Spitzen.
34. Brillante vom Elsterthal, S.; goldfarb. m. scharf. Rand u. Spitzen.
35. Charlemagne, Dufresne; goldfarb. m. bräunl. scharlach.
36. Deutsche Blondine, S.; blassschwefelgelb, nach aussen atlasweis.
37. Deutscher Phidias, S.; blassgelb m. blrth. rs. u. scharlach.
38. Erbgrossherzog v. Oldenburg, Bretschneider; brill. schwefelgelb bisweilen mit rother Knospe.
39. Florense Dombay, Salter; goldgelb mit weissen Spitzen.
40. General Sir Robert Sale, Smith; blassgelb mit purpurnen Spitzen.
41. Goldfasan, S.; dunkelgelb fein carmoisin getuscht.
42. Hahnemann, D.; prächtig goldgelb mit rothen Adern und carmin Spitzen prachtvoll.
43. Hufeland, D.; ocher, m. achatrothen Spitzen prächtig.
44. Isis, Truelle; mätgelb mit weissen Spitzen und bräunlichen Einf.
45. Liebliche v. Elsterthal, D.; hellschwefelgelb mit weissen Spitzen.
46. Luna, Dewoty; canariengelb mit weissen Spitzen.
47. Madame de Puiseguir, Lenorme; dottergelb mit violetten Spitzen.
48. Musaeus, D.; prächtig goldgelb mit rothgeflamnten Spitzen.
49. Oeillet de Bizare, Deelen; dkl. nanq. farb. blrth. u. breitgestreift.
50. — de Bohème, van Geert; hell ledergelb mit rs. Anfl. u. krschrth. Str. und Flammen.
51. Pythagoras, Santin; goldfarbig mit carmoisin gefl.
52. Pompey, Tassart; goldfarbig mit carmoisin gestreift, die schönste bunte, extra.
53. Schelling, D.; bernsteinfarbig mit rosa weissen Spitzen.

### *Braune und braun mit Abzeichnungen.*

54. Asmodeus, Davies; braunviolett.
55. Bathonica, Drummond; dunkelbraun violett.

56. Deutsche Kunst, S.; goldbr. m. lilla carm. prachiv. gez. n. Färbung.
57. — Marmorrose, goldfarbig prächtig dklamaranth, auf schwarzbraunen Grunde, abwechselnd m. carmin marmorirt und geflammt.
58. Deutscher Ordensstern, S.; amaranthbraun mit glänzend w. Spitzen, Prachtblume und ganz constant.
59. Empereur de Marocco, Houdoux; schwarzarm. m. weissen Spitzen.
60. General Faucher, Rose, röthlich rostfarben m. achat Rändern.
61. Hauptmann Schmidt, schwarzbr. m. purpurcarmin.
62. Joseph Balsameo, Bruneaus; mahagonybraun m. gelben Spitzen.
63. Le Domino noir, Lucot; schwarzbr. m. röthl. weissen Spitzen.
64. Obergärtner Stelling, D.; schwarzbraun mit purpur. Rand.
65. Oberjustizrath von Werlhof, dkl. smmt. schwarzbr. mit licht. Rand.
66. Pluton, Paris; schwarzbraun.
67. Rival Phidias, Batteur; braunroth mit goldgelb gestreift.
68. Roi de Pontes, Batteur; schwarzbraun mit weissen Spitzen.
69. Toussaint Louverture, Fauvels; fast schwarz extra.
70. Vixen, Truell; braun carmin mit weissen Spitzen.

### *Blut- und granatrothe.*

71. Beständige von Köstritz, D.; bluthroth mit reinweissen Spitzen.
72. Fräulein Mönch, purpurlilla.
73. General Negrier, Rose; achatroth mit purpur. Glanz.
74. Joseph Beck, kirschroth.
75. Landrath v. Zastrow, bluthroth mit weissen Spitzen.
76. Nelke, S.; bluthroth gelb gestreift u. gestrichelt.
77. Non plus ultra, Gayne; hellbluthroth m. weissen Spitzen.
78. Pfarrfrau von Gablenz, Kretzschar; bluthroth m. Mtlstrf. u. Sp.

### *Purpur- und carmoisinrothe.*

79. A. Keilholz, dunkel carmoisin.
80. Artevelde, Paris; purpurcarmoisin mit kirschroth u. weiss. Spitzen.
81. Alexander von Humboldt, Pracht; dkl. prp. viol. m. vichnbl. Schn. preht.
82. Beewing, Drummond; carmoisin.
83. Concordia, Huot; blaucarmoisin.
84. Duchesse of Southerland, carm. m. weissen Spitzen.
85. Edle von Meidling, Dewoty, amaranthpurpur, grosse Prachtblume.
86. Forget me not, Girling; dklarm. mit rein weissen Spitzen.
87. Freund Winter, S.; schwarz krschrlh. m. purp. violett gez. u. gefl.
88. Gloria v. Elsterthal, S.; leucht. coch. mit glänz. hellcarmoisin.
89. Joseph Apel, S.; dkl. amaranthpurpur mit schwarzbraun geflammt.
90. Langer Peter von Itehoe, dkl. mordairée carmoisin.
91. Parthenope, Rinz; rothviolett carmoisin, prächtig.
92. Seiderhelm, D.; bräunl. purp. mit silberlilla Spitzen.
93. Triumph v. Köstritz, S.; carm. auf dunkelgrau orange mit gldfrb. Sp.
94. Schiller, D.; schön violett m. reich. w. Spitzen, Prachtblume.
95. Wunder von Tattendorf, Girand; carm. mit lichtem Rand.

### *Violett-veilchenblau und lilla.*

96. Amalie, Herzogin von Ratibor, S.; violett carmin auf dkl. Grunde.
97. Angelica Kaufmann, D.; lilla grau, unten violett.
98. Dasinsky, Paris; lillagrau unten amaranth.
99. Deutsche Perle, köstl. silberlilla mit weissem Rand.
100. Edle vom Elsterthal, S.; prächtig lilla mit w. Spitzen.
101. Fürst von Thurn und Taxis, S.; prächtig rein lilla.

102. Geheimnißvolle, S.; dkl. amaranth violett m. kirschroth u. schwarzbraun gestreift u. gestrichelt, interessante Färbung.
103. Göthe, D.; bläul. lilla m. weissen Spitzen, Prachtbl.
104. Hofgärtner Bettzig, S.; prächtig dkl. lilla.
105. Jules Jamet, Méas; köstlich violett mit heller Rückseite.
106. Knigge, D.; köstl. violett nach aussen lichter.
107. Lord Mayor, Edward; viol. m. purp. Fl.
108. Magnificent, Keyes; violett mit rosa.
109. Oeillet Pantagruell, violettrosa mit carm. bord. und gestreift.
110. Pauline Voldauer, Dewoty; schön Veilchenblau.
111. Pestalozzi, D; lilla rs. auf orange Grund und f. gelben Spitzen.
112. Unique, Barnes; dunkel mit violettem Schein.

### *Aurora-, Orange-, Lachs-, Ziegel- und Isabellfarbig.*

113. aurantia multiflora, goldorange.
114. Bischof Athemar von Boy, Reichardt.
115. Deutscher Feuerstern, S.; leuchtend hellzinnober.
116. Deutsche Goldrose, S.; prächtig leuchtend orange mit goldbr. Rande.
117. — Liebe, S.; blass isabellfarb. auf fleischf. Gr. m. crm. Sp. extra.
118. Deutscher Held, S.; prächtig orangescharlach.
119. Die Leuchtende, feurig orangescharlach.
120. Dupetit Thouars, Miellez; ochergelb mit violetten Spitzen.
121. Friedensbote, S.; violett mit rosa und carmin-auslaufend.
122. Fürstin Trautmannsdorf, Girard; lachsroth mit graurosa.
123. Gestreifte von Elsterthal, S.; dunkelnaquinorange m. scharlach bandirt und gestreift.
124. incomparabilis, Smith; grauocher mit blaulilla Rückseite.
125. Lady Daxton, Turville; Bernsteinorange mit weissen Spitzen.
126. Louis Van Houtte, D.; hell nanquin mit incarnat.
127. Mignon, Paris; aurora mit orange, Prchtbl.
128. Morgenröthe, S.; cochenille in lachsrosa überg.
129. striata erecta, grünl. ochergelb mit weinrth. u. carm. bd. u. gestr.
130. Triomphe de Meaux, Quetier; orange mit lachs.
131. Zschokke, D.; graurth. m. weissem Mittelstreif u. Spitzen.

### *Mennigroth und scharlach.*

132. Baron Rothschild, Werker; leucht. scharlach ausgezeichnet.
133. Box, Drummond; dkl.schrl.
134. Cardinal Ferretti, Tassard; rein dkl.schrl. ausgez.
135. Diaconus Martini, carmoisinschrl.
136. Freund Carl Dosterschild, scharlachzinnober.
137. Glanz vom Elsterthal, S.; leuchtend scharlach zinnober, Prachtblume.
138. Glühende Kohle, S.; lebhaft scharl. in orange übergehend.
139. Grossfürst Michael Nicolajewitsch, S.; dunkelcochenillen scharlach Prachtblume.
140. Krusenstern, D.; prachtvoll scharlach carmin. m. rosa u. weissen Sp.
141. Leuchtende von Köstritz, S.; hell scharl. abwechselnd gelbl. w. Sp.
142. Leuchtkugel von Köstritz, S.; leuchtend scharlach, prächtig.
143. Pastor Uhlich, zinnoberorange.
144. Poulidetto, Millet; hellscharlach auf dklgoldgelb. m. weiss. Spitzen, prächtige Färbung.
145. Prunk v. Elsterthal, zinnbrth. Rd. mit w. dklbl und Spitzen.
146. Triumph von Magdeburg, scharlach mit weissen Spitzen.



*Carmin-, rosa- und pfirsichroth.*

147. Arabella, blassrosa mit violetten Spitzen.
148. Basquine, Poulet; brauncarmin bandirt mit weissen Spitzen.
149. Conseiller Massardt, sammetrosa mit weissen Spitzen.
150. Debureau, Miellez; rosa mit br. carm. gestr.
151. Deutsche Liliputrose, blassrosa m. feinen carmin Spitzchen.
152. Favorite, Batteur; centifolros. mit silbernem Schein.
153. Freiherr von Biedenfeld, schönstes carminrosa auf cochenille Grund, doppelt gefüllt, Prachtblume.
154. Friedrich Rückert, D.; carm. geränd. m. w. Sp. seltene bunte Färb.
155. Fürstin Lieven, S.; zart. pfirsichr. lilla mit rosa Sp. prachtvoll.
156. Heinrich Behrens, S.; prachtvoll carm. mit cochenille.
157. Himmel, D.; achat carm. aussen or. m. rosa weissen Spitzen.
158. Hofgärtner Bosse, carm. violett. doppeltgefüllt.
159. La Rosiers, Batteurs; rosa mit roth gestreift sehr gross u. schön.
160. Majorene, rosa im Herz weiss.
161. Marchionesse of Cornwallis, Whale; zart rosa mit weiss.
162. Mstr. Clay, dunkel carmin mit weissen Spitzen.
163. Pius IX., Batteur; zartrosa mit weiss schattirt.
164. Rosenfee, S.; schönstes rosa, Prachtblume.
165. Rosenmädchen, S.; blühend carmin.
166. Stolze Germania, blass incarnatrosa prächtig.
167. Zenobia, Batteur; rosa lilla mit braunr. gestr. extra.

**VIII. Pelargonien.****I. Englische grossblumige, Aeltere**  
à 7½ u. 10 Ngr.

- |                                     |                                |                               |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Adele Foster.                    | 14. Enchantress Foster.        | 70. Mogarth.                  |
| 57. Alione Bendl.                   | 62. Ernst von Schwanefeld.     | 27. Mogul Gaines.             |
| 58. Amélie Chauvière.               | 15. Fair Maid of Devon Veitch. | 28. Nabob Foster.             |
| 2. Anathe Foster.                   | 63. Favorite.                  | 29. Namelus Garth.            |
| 3. Apollo.                          | 64. Flash Garth.               | 71. Oberon Hodges.            |
| 4. Arabella Gaines et Garth.        | 65. Floridum.                  | 30. Orange Perfection Gaines. |
| 5. Archbishop of Canterbury Master. | 16. Fräulein Bachmann.         | 72. Paterot.                  |
| 6. augustissimum.                   | 17. Freiherr von Finke.        | 31. Perfection Garth.         |
| 7. — fastuosum.                     | 18. Friedr. Wilhelm IV.        | 32. Premier Garth.            |
| 8. Camilla Willson.                 | 19. Gem of the West Nairn.     | 33. Pride of Surrey Gaines.   |
| 9. Centurion Beck.                  | 20. Hamlet Lyne.               | 34. Princesse Royal.          |
| 10. Clarissa Garth.                 | 66. Hariarthianum.             | 73. Priory King Baskelt.      |
| 11. Constellation Garth.            | 21. Jvanhoe Wilson.            | 35. pungens.                  |
| 59. Derbight.                       | 22. King of Saxonia H. Angl.   | 74. Rameau Hort. Par.         |
| 12. Duchesse of Leinster Gaines.    | 23. — — France.                | 36. Rosetta Foster.           |
| 60. Duchesse of Portland h. Angl.   | 24. Lady Nikesdale.            | 75. Selima Foster.            |
| 13. Elanissa.                       | 67. Lifeguardsman Foster.      | 76. Talisman Demay.           |
| 61. Eliza superba Foster.           | 25. Magog Foster.              | 37. Tamburini.                |
|                                     | 26. Master piece Gaines.       | 77. Teutonia.                 |
|                                     | 68. Mathilde Foster.           | 38. The Cid Foster.           |
|                                     | 69. Medora Foster.             | 39. Van Ambourgh Wilson.      |
|                                     |                                | 78. velutinum elegans.        |
|                                     |                                | 40. Victoria Garth.           |

79. Vulcan Foster.  
80. Wildfire.  
81. Zamzumium Beck.

## II. Neueste grossblumige.

- |                                    | Ngr. |
|------------------------------------|------|
| 82. Aspasia Gaines . . .           | 10   |
| 83. Beatrice Hoyle                 | 20   |
| 84. Beauty de Montpellier Rundle   | 15   |
| 85. Berne Trimmer . . .            | 20   |
| 86. Chamaeleon . . .               | 15   |
| 87. Charlemagne . . .              | 15   |
| 88. Comissioner Beck . . .         | 20   |
| 89. Docteur Andry Chauvière . . .  | 15   |
| 90. Forget me not. Lyne . . .      | 15   |
| 91. Generalissimo Hoyle . . .      | 15   |
| 92. Harlequin . . .                | 15   |
| 93. Illuminator Turner . . .       | 15   |
| 94. Jullien Brown                  | 15   |
| 95. Jupiter . . .                  | 15   |
| 96. Louis Van Houtte Trimmer . . . | 25   |
| 97. Mochanna Hoyle . . .           | 15   |
| 98. Nectar Cup Hoyle . . .         | 10   |
| 99. ocellatum Hoyle . . .          | 20   |
| 100. Reuron . . .                  | 15   |

## III. Fancy-Varietäten. Aeltere,

à 7½ — 10 Ngr.

41. Artémise Dufoy.  
42. Belle africaine.  
43. Lelia.  
44. Mazeppa -superba Fondeur.  
45. Mulatto.  
46. Prima Donna Henderson.  
47. Queen Victoria Shepherd.  
48. Splenii.  
49. Vesta Foster et Wilson.  
50. Violinski Chauvière.

## IV. Neueste Fancy-Varietäten.

- |                                     | Ngr. |
|-------------------------------------|------|
| 101. Advancer Ambrose . . .         | 15   |
| 102. Atalante . . .                 | 15   |
| 103. Auguste Mieliez J. Odier . . . | 45   |
| 104. Criterion Henderson . . .      | 20   |
| 105. Flora . . .                    | 15   |
| 106. formosissima Ambrose . . .     | 15   |
| 107. Gipsy Queen Ambrose . . .      | 15   |
| 108. Gloire de Bellevue J. Odier    | 30   |

- |  | Ngr. |
|--|------|
| 109. Jacques Duval J. Odier . . .        | 30   |
| 110. Julie Beaval                        | 15   |
| 111. Lady Flora Hastings . . .           | 15   |
| 112. Non such. Hoyle . . .               | 20   |
| 113. Petite miniature . . .              | 15   |
| 114. Proserpine . . .                    | 15   |
| 115. Queen of the Fancys Henderson . . . | 20   |
| 116. Reinedes Françaises Chauvière . . . | 20   |
| 117. Sambo Ambrose . . .                 | 15   |
| 118. Stanislas Le moine . . .            | 15   |
| 119. Sydonie J. Odier . . .              | 15   |
| 120. Triomphe de la Tour Odier . . .     | 30   |

## V. Scarlet.

à 5 Ngr.

51. Firebal.  
52. Goliath.  
53. Miss Arndt.  
54. Queen Victoria.  
55. superba Foster.  
56. zonale fol. variegatis.

## IX. Rhododendron.

- |  | Thlr. Ngr. |  | Thlr. Ngr. |
|--|------------|--|------------|
| 1. arboreum Sm. bello Leopoldine . . .         | 15         | 12. Catawbiense étendard de Flandre . . .          | 3 —        |
| 2. — Burggravianum . . .                       | 15         | 13. — fastuosum fl. pl. V. Houtte . . .            | 1 —        |
| 3. — Deleanum . . .                            | 15         | 14. cinnamomeum Ldl. . .                           | 15         |
| 4. — glabrum . . .                             | 15         | 15. Gibsoni Hortul. . .                            | 20         |
| 5. — grandidissimum . . .                      | 15         | 16. hybridum (maximum) . . .                       | —          |
| 6. — magniflorum . . .                         | 15         | 17. — Cartonianum Ldl. . .                         | 10         |
| 7. — speciosum Smith . . .                     | 15         | 18. — enneandrum D. C. . .                         | 10         |
| 8. — Waeberi H. Dresd. . .                     | 15         | 19. hybr. (v. Azalea sinens). aureum Smith . . .   | 1 —        |
| 9. — Wilmouti . . .                            | 15         | 20. — (v. Azalea) carneum elegantissimum Hort. . . | 1 —        |
| 10. — Wiltoni . . .                            | 15         |  |            |
| 11. Catawbiense Mehx. Duc de Brabant V. Houtte | 4 —        |  |            |

	Thlr.	Ngr.		Thlr.
21. hybridum (v. Azalea) Nor-bitonense . . . . .	1	—	32. aromaticum Hook. fil. . . . .	8
22. — ( — — ) Yellowish . . . . .	1	—	33. barbatum Wall. . . . .	1
23. javanicum Bennett (Vireya Blume) . . . . .	1	10	34. calyculatum Hook. fil. . . . .	2
24. nepalense . . . . .	—	15	35. campylocarpum Hook. fil. . . . .	3
25. ponticum L. . . . .	5	Ngr.-2	36. ciliatum Hook. fil. (lilacinum) . . . . .	3
26. — Vervaeenaeum fl. pl. Vervaeae . . . . .	—	30	37. cinnabarinum Hook. fil. . . . .	3
27. Rollissoni . . . . .	—	15	38. cordatum Hook. fil. . . . .	4
28. zeylanicum . . . . .	—	15	39. Dalhousiae Hook. fil. . . . .	7
<b>Rhododendron vom Sikkim-Himalaya.</b>			40. Edgeworthii Hook. fil. . . . .	4
(Herbst-Veredelung mlt 50% Rabatt.)			41. Falconerii Hook. fil. . . . .	8
	Thlr.		42. fulgens Hook. fil. . . . .	3
29. aeruginosum Hook. fil. . . . .	4		43. glaucum Hook. fil. . . . .	3
30. Alpine Red. . . . .	8		44. lanceifolium Hook. fil. . . . .	3
31. — Shrubbi . . . . .	4		45. niveum Hook. fil. . . . .	3
			46. lepidotum Don (salignum) . . . . .	3
			47. Thompsonii Hook. fil. . . . .	4
			48. Wallichii Hook. fil. . . . .	3
			49. Wightii Hook. fil. . . . .	4
			50. spec. very fine scarlet. . . . .	2

## X. Rosen.

Durch hinlängliche Vermehrung bin ich in den Stand gesetzt, für einjährige Stecklinge 50 0/0 zu gewahren, bei Thea-Rosen jedoch nur 25 0/0.

	Ngr.		Ngr.
1. Ayrshira plena . . . . .	5	<i>R. microphylla.</i>	
2. Banksia lutea plena . . . . .	5	22. bicolor nouvelle . . . . .	3
3. bracteata Leonidas . . . . .	4	23. de Luxembourg . . . . .	3
4. capucine jaune de Perse . . . . .	10	24. purpurea de Luxembourg . . . . .	3
5. centifolia panachée Vibert . . . . .	5	<i>R. multiflora.</i>	
6. cordica striata . . . . .	3	25. bicolor . . . . .	3
7. hybrida Maltonensis . . . . .	5	26. noisettina . . . . .	6
8. Lanouviensis . . . . .	5	27. purpurea . . . . .	5
9. Louis Napoleon . . . . .	5	<i>R. centifolia muscosa.</i>	
10. pimpinellifolia lutea plena . . . . .	5	344. Jenny Lind (Reine des Mousseuses) . . . . .	20
11. provincialis Narcisse de Salvandy Parmentier . . . . .	15	345. Lénéi . . . . .	20
12. — tricolor de Flandre V. Houtte . . . . .	15	346. Nuits de Young . . . . .	20
<i>R. Bourbonica.</i>		<i>R. Noisettiana.</i>	
13. Duc d'Isly . . . . .	10	28. à grandes fleurs violettes . . . . .	3
14. Hermosa . . . . .	6	29. à odeur très suave . . . . .	3
15. Madame Soldini . . . . .	6	30. Adelaide d'Orleans . . . . .	3
16. Pierre de St. Cyr . . . . .	3	31. Aimé Heine . . . . .	3
17. Princesse de Croy . . . . .	3	32. amabilis . . . . .	3
<i>R. Lawrenceana.</i>		33. Azetta . . . . .	4
18. kermesina . . . . .	3	34. Bougainville . . . . .	3
19. — plena . . . . .	3	35. Carbonari . . . . .	3
20. Rubin de Lawrenceana . . . . .	3	36. Camellia purpurea . . . . .	3
21. varietas nana . . . . .	3	37. changeante . . . . .	5

	Ngr.		Ngr.
38. Charles X. . . . .	6	90. Duchesse de Kent . . . .	5
39. Chaurinaus superbe . . . .	6	91. Eugène Beauharnais . . . .	6
40. Cherari . . . . .	3	92. Fabvier . . . . .	3
41. Circe . . . . .	5	93. Fackirii . . . . .	6
42. communis plena . . . . .	3	94. Fénélon de Luxembourg . .	5
43. d'Anjou . . . . .	3	95. fulgens . . . . .	3
44. Desprez . . . . .	3	96. gloire d'Auteuil . . . . .	3
45. Duc de Broglie . . . . .	6	97. — de Daniel . . . . .	4
46. Duchesse de Champagne . .	3	98. — — Guérin . . . . .	4
47. Fellenberg . . . . .	6	99. — — Peley . . . . .	5
48. Isabelle d'Orleans . . . . .	6	100. grande Hercule . . . . .	4
49. Isle de Bourbon . . . . .	3	101. — vallée . . . . .	3
50. La chérie . . . . .	6	102. la croix . . . . .	3
51. Lafayette . . . . .	5	103. la superbe . . . . .	6
52. Lée . . . . .	6	104. lychnidiflora . . . . .	3
53. Marianne . . . . .	5	105. Marquise of Cornwallis . .	4
54. media . . . . .	4	106. Miranda . . . . .	5
55. mignonne . . . . .	6	107. Mstr. Bosanquet . . . . .	6
56. nymphe Echo . . . . .	3	108. Molinieri . . . . .	3
57. Puseau . . . . .	4	109. nouvelle de Marseille . .	4
58. Roi de Carmoisier . . . . .	3	110. Osiris . . . . .	4
59. rosea . . . . .	4	111. paeoniaeflora . . . . .	6
60. Rotanger . . . . .	5	112. Paluvienne . . . . .	3
61. Smuths Yellow . . . . .	10	113. Penelope Luxembourg . .	6
62. spectabilis . . . . .	3	114. Prinz Wilhelm . . . . .	6
63. Thelaine . . . . .	3	115. purpurea . . . . .	5
64. Theodor Körner . . . . .	6	116. ranunculoides purpurea . .	5
65. victorieuse . . . . .	5	117. splendens . . . . .	6
<i>R. semperflorens (bengalensis).</i>		118. tenella . . . . .	6
66. Amiral de Rigny . . . . .	5	119. très double . . . . .	6
67. Alfonsonia . . . . .	3	120. Turén . . . . .	6
68. Archiduc Charles . . . . .	6	121. victoire d'Aumy . . . . .	3
69. belle de Dames . . . . .	3	<i>Rosa Thea.</i>	
70. — — Mouza . . . . .	3	122. à odeur de muscate . . . .	3
71. — Isidore . . . . .	5	123. abricotée . . . . .	6
72. Bernard de Montholn . . . .	5	124. Aegina . . . . .	4
73. Bischonia . . . . .	6	125. Aetna . . . . .	3
74. Bison d'Angers . . . . .	3	126. africana . . . . .	4
75. Bouquet à fleur rouge . . . .	4	127. alba . . . . .	5
76. Calvertia purpurea . . . . .	3	128. — imperialis . . . . .	5
77. Calypso . . . . .	3	129. Archiduchesse de Palatina .	3
78. camelliaeflora . . . . .	3	130. — Thérèse Isabelle . . . .	5
79. camellia alba . . . . .	5	131. Barbot . . . . .	6
80. — Flora nova . . . . .	3	132. belle Archinto . . . . .	3
81. César Cardet . . . . .	6	133. — Ferronnier . . . . .	5
82. Cheremite de Soigne . . . . .	3	134. — Helene . . . . .	3
83. comble de gloire . . . . .	4	135. — Levailière . . . . .	3
84. Comptoniana . . . . .	3	136. Bergmann . . . . .	5
85. Cupido . . . . .	6	137. Besnier . . . . .	6
86. Darius . . . . .	3	138. Bigottine . . . . .	3
87. Deton . . . . .	4	139. Bougère . . . . .	3
88. Duc de Berry . . . . .	3	140. Bourbon . . . . .	6
89. Duchesse de Parma . . . . .	6	141. Buret . . . . .	4



	Ngr.		Ngr.
248. Madame Aimée . . . .	10	296. Géant des batailles Guillot	12
249. — Trudeau Boll. . . .	12	297. General Allardt . . . .	10
250. Mozador (Rose du Roi pourpre) . . . . .	10	298. — Délaage Robert . . . .	30
251. Odeska Vibert . . . . .	10	299. — Morangiez Portemer	10
252. Olivier de Serre Vibert .	12	300. George Lecamus Laffey .	12
253. Petite Negresse Vibert .	12	301. Gloire d'Angers Boyan .	12
254. ponctuée . . . . .	10	302. — de Rosanienne . . . .	12
255. Prince de Galles . . . .	10	303. Guilbert Slater Vibert .	12
256. Rosalba Vibert . . . . .	10	304. Guillot . . . . .	12
257. Sappho Vibert . . . . .	10	305. Henri IV. Vibert . . . .	12
258. Sidonie Vibert . . . . .	10	306. Joasine Banet Vibert .	20
		307. Jaques Lafitte Vibert .	20
<i>R. hybr. remontantes.</i>			
259. Angelina . . . . .	12	308. Lady Elphinstone . . . .	10
260. André Chéniera Robert .	15	309. — Fordwick . . . . .	10
261. Antigone Vibert . . . .	12	310. Lane . . . . .	10
262. anormale . . . . .	12	311. Louis Bonaparte . . . .	10
263. Auguste Mie Laffey . . .	30	312. Louise Peronny Lacharme	15
264. Augustine Mouchélet . .	10	313. Ludovic Letanal Ducher	15
265. Aurelia . . . . .	15	314. Madame Andry Verdier .	15
266. Baronne Halley de Clapa- rède Portemer . . . . .	12	347. — Campbell d'Islay (Triom- phe de valenciennes) . . . .	20
267. Baron Prévost . . . . .	10	315. — Cornet . . . . .	12
268. Blanche Lamoureux . . .	10	316. — Fremion Margottin .	15
269. Bouton de fleurs . . . .	12	317. — Laffey . . . . .	12
270. Caroline de Sansal Des- prez . . . . .	15	318. — Lamoricière Port. . . .	12
271. Casimir de Lavigne Vibert	15	319. — Peupin Verdier . . . .	12
272. Charles Boissières . . . .	15	320. Marquesa Bocella . . . .	10
273. Chénie de Chateaubriand Oudin . . . . .	10	321. Merope . . . . .	12
274. Claire Duchatelet . . . .	10	322. Mistress Elliot . . . . .	10
275. Clémence Isaure Robert .	20	323. Montaigne I. Vibert . . .	12
276. Comte Bobrynski Marest	12	324. — II. . . . .	15
277. — de Bouimont Oger . . .	25	325. perpétuelle mousseuse . .	15
278. — d'Eu . . . . .	12	326. Pie IX. Vibert . . . . .	12
279. — d'Devonshire . . . . .	12	327. Princesse Hélène . . . .	10
280. — de Montalivet . . . . .	12	328. Prince Albert . . . . .	10
281. — de Paris . . . . .	12	329. Pourpre Royal Laffey .	10
282. Comtesse de Duchatel . .	10	330. Rachel . . . . .	12
283. Coupe de Hébé . . . . .	15	331. Reine Mathilde Oger . . .	12
284. Delphine Hay Vibert . . .	20	332. Rivers . . . . .	10
285. Desgaches Lacharme . . .	15	333. Robin Hood . . . . .	15
286. Docteur Arnal Roesser . .	12	334. Roussard Vibert . . . . .	12
287. — Marjolin . . . . .	10	335. Rose de la Reine Laffey	10
288. Duc d'Aumale . . . . .	10	336. Rosine Margottin Mar- gottin . . . . .	15
289. Duchesse de Nemours . .	10	337. Tasso . . . . .	10
290. — — Southerland . . . .	10	338. Tite-Live Vibert . . . . .	12
291. Edouard Jesse . . . . .	10	339. Trojan . . . . .	10
292. — Leczinska . . . . .	12	340. Vaillante Bergère . . . .	10
293. Elise Miellez . . . . .	15	341. William Griffith Portemer	15
294. — Mosser . . . . .	12	342. — Jesse . . . . .	10
295. Ernestine de Brabant . .	10	343. Yolande d'Aragon . . . .	10

## XI. V e r b e n e n .

Durchwinterte Pflanzen à Stück 3 Ngr., à Dutzend 1 Thlr.

1. Adeli.	25. Eliza.	63. Ninon de l'enclore.
3. alba variegata maculata.	26. Emma.	64. Noémi.
2. Anatole.	28. Euphrosyne.	65. Oracle.
6. Angelina Den.	29. Fanny Elsler Den.	66. Othello.
7. Apolline Den.	30. Felix	45. Parfum Madelaine Den.
4. Apollon.	27. Imperatrice Eugénie.	67. Prima Donna.
8. Attraction Ivery.	39. Ingrami.	46. Princesse Alicia Wynes.
9. Barkerii.	31. Jeanne d'Arc. Niv.	47. — de Navarre Den.
11. Boule de feu.	40. Jenny Lind.	48. purpurea perfecta.
5. Bouquet de Vénus.	41. La Déesse.	68. Reine de Amazones.
12. Brown.	42. La Marquise.	49. Reine de France.
13. Camille Nivert.	32. La Mauresse Den.	50. Renovera.
14. Charles Wood.	33. le Président.	51. Robinson Dehance.
15. Castellane Den.	34. Louis Philippe.	69. Rosalie.
16. Castille Den.	35. macrantha.	52. Samia.
17. Childe Herolde.	36. Madame Briolett.	53. scabra.
18. Cleopatra Niv.	37. — Chalandon Den.	54. speciosissima.
19. Clotilde Chauviere.	38. — Karem.	56. St. Margarethe Barker.
10. Comtesse de Bresson.	43. — Lemonier.	59b. Valentine de Sa-veuse.
21. Denise Den.	55. — Sonntag De-foy.	59. Van Houttei.
22. Duc of Cornwallis.	57. Marie.	61. Victoria.
23. — of Roxborough.	44. Minerva.	62. Zenobie Niv.
20. elegans.	58a. Morincourt.	
24. Eleonore Den.	60. Nelly.	

## Dutzend- und Hundert-Preise.

### Warmhauspflanzen.

jedoch nur nach meiner Wahl; sowie Hundert-Preise nur bis wenigstens 50 Stück und Dutzend-Preise nur bis ein halb Dutzend berechnet werden; ebenso gelten die Preise für Knollen nur bis zum April, dann treten Stückpreise ein.

Stück.		Thlr. Ngr.
100	Achimenes, mit Namen, ältere Sorten . . . . . k	blühbar 1 20
100	— — — neuere Sorten . . . . . k	— 3 —
12	— Chirita (Scheeria mexicana) . . . . .	1 —
100	— ohne Namen, in vielen Sorten . . . . .	1 —
6	Aechmea fulgens . . . . .	2 —
12	Aeschynanthus, in 6 Sorten stark . . . . .	für Ampeln 1 10
12	— in 12 Sorten . . . . .	2 —
12	Alloplectus, in div. Spec. . . . .	blühbar 2 —
12	Amaryllis solandraeflora . . . . .	10-16 —
100	Ananas, (durchwinterte Kindel) . . . . .	sehr stark 15 —
100	— 2jährig	65 —
12	— 3jährig } gerippte, rundbeerig, }	16 —
12	Aristolochia, in div. Spec. . . . . r	blühbar 2 —

Stück.			Tblr. Ngr.
12	Aroideen in 12 Species . . . . .	stark	2-4 —
25	— in 25 Species . . . . .	—	4-8 —
12	Begonien, in 12 älteren Sorten . . . . .	blühbar	1 15
25	— in 25 Sorten, worunter der neueren . . . . .		5 —
12	Billbergien, in div. Spec. . . . .	stark	2 —
12	Burchellia capensis . . . . .	—	2 —
12	Cissus discolor . . . . .		2-4 —
12	Columnnea, div. Spec. . . . .	stark	2 —
12	Curculigo recurvata . . . . .		2-4 —
12	Dionaea muscipula . . . . .		12-18 —
12	Dioscorea alata et discolor . . . . .	<b>k</b>	2 —
12	Dracaena arborea . . . . .	1 Fuß	4 —
12	— terminalis rosea . . . . .	üppig 6 Zoll	2 —
12	— — — — —	— 12 —	4 —
12	Eranthemum, in 4 Sorten . . . . .	blühbar — 1½ Fuss	1 20
12	Farn in 12 Species . . . . .		2 —
50	— in 50 Spec. darunter seltene . . . . .		12 —
12	Gardenia malleifera (Whitfieldi), Sherbourniae & Stanleyana . . . . .		4 —
12	— radicans, mit Knospen . . . . .	buschig	3 —
12	— — Halbstämme, veredelt . . . . .	m. Kronen u. Knsp.	6 —
12	— — — — —	vorjährig veredelt	3 —
12	Gesneria Geroldiana, zebrina et zebrina grandiflora (Nägeli) <b>k</b> . . . . .		— 15
12	Gloxinien, mit Namen . . . . .	<b>k</b> blühbar	1 10
12	Gloxinia erecta . . . . .	<b>k</b> —	3 —
12	Hedychium, div. spec. . . . .	stark	4 —
12	Heliconia, div. spec. . . . .	—	3 —
12	Heliotropium, div. hybr. . . . .		1 10
12	Hibiscus, in 6 div. Species . . . . .	ästig	1 20
12	— speciosus . . . . .	stark	1 20
12	Hoya div. spec. . . . .	<b>r</b> —	2 —
12	Ipomaea, div. spec. . . . .	<b>r f</b> blühbar	1 25
12	Isolepis prolifera & pygmaea . . . . .	Ampelpflanzen	1 6
12	Ixora coccinea . . . . .		2 —
12	Jasminum Sambac . . . . .	<b>r</b> blühbar	1 20
12	— — flore pleno . . . . .	<b>r</b> —	2 —
12	Justicien, div. spec. . . . .	<b>f</b> —	1 20
12	Kämpferia Galanga . . . . .	<b>k</b> —	1 20
12	Lantauen, div. spec. . . . .	<b>f</b> —	1 15
12	Latania borbonica, mit schon getheilten Wedeln . . . . .		40-50 —
12	Lycopodium, div. spec. . . . .		1 15
12	Manettia, div. spec. . . . .	blühbar	1 20
12	Mangifera indica . . . . .		30-40 —
12	Maranta, div. spec. . . . .	—	1 25
12	Melastoma, div. spec. . . . .	—	1 20
6	Melicocca bijuga . . . . .		16 —
12	Nymphaea Ortgesiano-rubra . . . . .	—	4 —
6	Oenocarpus utilis, Weinpalme . . . . .	—	30 —
12	Orchideen, div. spec. . . . .	—	12-24 —
12	— Cautleya Mossiae, Originalpfl. . . . .	stark u. blühb.	18-24 —
6	— Cyrtopodium punctatum . . . . .	—	9-12 —
12	— Oncidium Papilio . . . . .	—	12-18 —
12	Passifloren, in 4 div. spec. . . . .	<b>r</b> —	1 25
12	Phrynium setosum . . . . .	stark	2 —
12	Pitcairnen, in div. Spec. . . . .	—	2 —



Stück.		Thlr. Ngr.
12	Plumbago, div. spec. . . . .	1 20
6	Puya Altensteini . . . . .	stark u. blühh. 1 15
12	Ruellien, div. spec. . . . .	blühbar 1 20
12	Russelia div. spec. . . . .	— 2 —
6	Saccharum officinarum, Zuckerrohr . . . . .	2-3 —
6	Sapindus Saponaria, Seifenbaum . . . . .	9 —
12	Sarracenia purpurea, starke Originalpflanzen . . . . .	10-20 —
50	— — — — —	30-50 —
12	Scutellaria, in div. spec. . . . .	blühbar 1 20
12	Siphocampylus, in div. spec. . . . .	— 1 20
12	Thunbergien, in div. spec. . . . .	<b>r f</b> — 1 25
12	Torenia asiatica & concolor . . . . .	<b>r</b> . . . . . 1 20
12	Tradescantia, in div. spec. . . . .	— 1 20
12	Tympananthe suberosa (Dictyanthus Pavonii) . . . . .	3 —
100	Warmhauspflanzen in 100 Sorten . . . . .	meist blühbar 10 —
100	Warmhaus-Decorationspflanzen . . . . .	20 —
12	Wasserpflanzen, div. schöne spec. . . . .	blühbar 6 —

## Kalthauspflanzen.

Jedoch nur nach meiner Wahl u. s. w.

Stück.		Thlr. Ngr.
12	Abutilon, div. spec. . . . .	2 —
12	Acacia paradoxa, stark . . . . .	1 10
6	Aucuba japonica . . . . .	1 —
12	Azalea indica, in 12 Sorten, blühbar . . . . .	3 —
12	— ohne Namen, blühbar . . . . .	1 15
100	— mit Namen, blühbar . . . . .	13 —
6	— Danielsiana . . . . .	1 —
12	Bignonien, div. Spec. 1—2 Fuss . . . . .	<b>r</b> 1 15
12	Camelien, mit Namen, wurzelächt. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss . . . . .	2 —
100	— mit Namen $\frac{1}{2}$ —1 Fuss . . . . .	12 —
12	— neuere und neueste Sorten, $\frac{1}{2}$ —1 Jahr . . . . .	4 —
50	— — — — —	12 —
12	— ohne Namen, gefüllt, dankbar blühend, 4—6 Fuss . . . . .	24 —
12	Canna div. sp. . . . .	<b>f k</b> 1 —
12	Chrysanthemum, zwergartige, starke Büsche, <b>f z.</b> Theil . . . . .	1 —
12	Cinerarien, mit Namen . . . . .	2 —
6	Citrus sinensis . . . . .	1 15
12	Clematis Viticella . . . . .	3 —
12	Crassula coccinea . . . . .	1 20
12	Cuphea, div. spec. . . . .	<b>f</b> 1 —
12	Cyclamen europaeum . . . . .	<b>k</b> 2 10
12	Daphne Dauphin, 1 Fuss . . . . .	2 —
6	Datura arborea . . . . .	1 —
12	Deutzia sanguinea . . . . .	2 —
12	— — kleine Büsche . . . . .	<b>b</b> 2 —
12	Diosma, in div. Spec., buschig . . . . .	1 20
12	Ferraria Tigridia . . . . .	<b>z</b> — 10
12	Fuchsia, in 12 neueren Sorten . . . . .	<b>f</b> 1 15
12	Georginen, die neuesten und besten . . . . .	<b>k</b> 1 20
12	Habrothamnus, in div. spec. . . . .	1 15
12	Hedera, in div. spec. . . . .	1 20
12	Hydrangea hortensis, stark . . . . .	<b>e k</b> 2 —

Stück.		Thlr. Sgr.
12	Jasminum, in div. spec. . . . .	1 20
12	Lilium lancifol, in div. spec. blüßbar . . . . .	4 —
12	Melaleuca, div. spec. ästig 1—2 Fuss . . . . .	1 15
12	Metrosideros semperfl., 1—2 Fuss . . . . .	1 15
100	Oxalis tetraphylla . . . . .	b k — 15
6	Paulownia imperialis, stark . . . . .	b k 6 —
12	Pelargonium, ältere . . . . .	2 15
12	— neuere u. neueste . . . . .	4 —
12	Petunien, schöne Hybriden . . . . .	2 —
12	Pentstemon, stark . . . . .	f 1 20
12	Pittosporum, blüßbar . . . . .	1 20
12	Primula auricula, (Luiker) aus einem Mustersort. . . . .	1 —
12	Rhododendron arboreum . . . . .	4 —
6	— vom Sikkim Himalaya . . . . .	15 —
12	— — — — — . . . . .	24 —
12	Rosa semperfl. Noisettiana & Thea nur gute Sorten . . . . .	e 1 6
12	— Thea, nur gute Sorten . . . . .	f 1 20
12	— hybr. remontante et perpetuelle, nur gute Sorten . . . . .	f 4 —
100	— in 100 Sorten, nur gute Sorten . . . . .	e 10 —
100	— in 50 Sorten, nur gute Sorten . . . . .	e 6 —
12	— ohne Namen, nur gute Sorten . . . . .	e 1 —
12	Salvia, in div. spec. . . . .	b 1 10
12	Symphoricarpos racemosa fol. var. . . . .	f 1 20
12	Sorten, schön blühender Stauden . . . . .	b 1 15
50	— — — — — . . . . .	b 2 20
100	— — — — — . . . . .	5 —
100	Stauden ohne Namen, 30—40 Sorten . . . . .	b 2 15
100	Sträucher, in div. Spec. stark . . . . .	10 —
12	Thuja occidentalis 3—5 Fuss hoch . . . . .	f 6—10—
12	Verbenen in 12 Sorten . . . . .	f 1 —
12	Veronica div. spec. . . . .	f 1 20
12	Viburnum Tinus . . . . .	1 15
50	— — — — — . . . . .	4 —
12	Zephyranthes candida . . . . .	z 1 15

### Melocactus amoenus Hfegg.

Originalpflanzen, die grossen mit Schopf à 5—10 Thlr.

### Latania borbonica Lam.

Niervon besitze ich 3 Prachtpflanzen, die einer näheren Beschreibung werth sein dürfen, sie haben ohne aufgerichtete Wedel und ohne Kübel 6—7 Fuss Höhe, mit je 12 Wedeln, die kleinen ungezählt, deren ganze Länge 5—7 Fuss, und deren Fächerbreite 4—5 Fuss beträgt, dabei haben die Pflanzen einen Umfang von 24—30 Fuss. In der Mitte eines nicht zu kleinen Warmhauses aufgestellt, würden sie den Glanzpunkt einer jeden, wenn auch ausgewählten Sammlung bilden.

Der genau zu bestimmende und verhältnissmässig billige Preis bleibt specieller Unterhandlung vorbehalten.

Einladung zur Subscription auf eine neue Camellie.

## Camellia Commerzienrath Linau Geitner.

Noch ungetauft acquirirte ich diese brillante Camellie, welche begabt mit allen Tugenden einer guten Blume, würdig ist, den Namen ihres Züchters zu tragen. Die Stammpflanze blühte schon mit über 50 Blumen, was sicher geeignet ist, sie genau zu prüfen, und wodurch man sich überzeuget, dass die erste, wie letzte Blume bis zur kleinsten Knospe ohne abzuwerfen, ohne zu variiren sich durch alle Stadien, mit gleicher Regelmässigkeit und Pracht entfaltete. Ihr Bau ist untadelhaft, regelmässig, ohne den geringsten Knopf, die Farbe ist das reinste saftig-feurig-leuchtende Rosa; je nach dem Stadium der Entwicklung dunkler, lichter, und es ist nicht ein Blättchen, welches ausser cerise-rothen Aederchen den weissen Mittelstreifen, gleichsam als harmonische Abschattirung, nicht durchscheinen liesse. Dieser Mittelstreifen ist nicht grell, nicht harlekinartig, er stört nicht, sondern vermittelt die zarte Harmonie, welche über die ganze Blume in Form und Farbe ausgegossen ist; sie blüht aber auch reich und dankbar, denn die ganze Stammpflanze ist aufs Neue mit Knospen bedeckt.

Lassen wir nun den sehr ehrenwerthen Züchter, den Herrn Commerzienrath Linau selbst reden: „Der Bau prangte neben der Low'schen *miniata*, *exquisita*, *Jubilé*, *caryophylloides*, *optima* etc., ich sage, sie prangte daneben und gewährte durch ihre Grösse und Regelmässigkeit einen Anblick, der Kenner und Laien gleich überraschte. Wie ich Ihnen schon bemerkte, kenne ich von all' den Gepriesenen keine, wo eben die Striche so regelmässig sich auf jedem Blättchen finden, ausser der *Queen Victoria*, deren Farbe etwas schmutzig ist.“

Es ist wahr, die letzten Jahre brachten uns Blumen von auffallenderen Abzeichnungen in den contrastirendsten Farben; wir wollen aber zur Blüthezeit die reichsten Sammlungen durchwandern, ob diese wirklich so reich, so constant blühen. Jene aber hat unter 50 an einer Pflanze geöffneten Blumen, in den durch die verschiedensten Stadien bedungenen Abschattirungen, nicht eine Blume, die nicht constant in Bau, Farbe und Zeichnung gewesen. Ist dies nicht Alles, was ein Freund der Camellien beansprucht? Dennoch sind noch nicht alle ihre Tugenden erschöpft, denn dadurch, dass sie durch Stecklinge gut wächst, wird ihr Werth verdoppelt.

Die Anmeldung zur Subscription ist eröffnet und bleibt so lange offen, bis eine bestimmte Zahl Subscribenten gezeichnet haben werden. Der Schluss derselben wird durch Avis an die Betheiligten zur Kenntniss gebracht; auch haben bis dahin die geehrten Herren Subscribenten die Einzahlungen an sich zu halten.

1 Pflanze von	4 Zoll Höhe	5 Thlr.
1 „ „	7 „ „	6 „
1 „ „	9 „ „	7 „
1 „ „	10–11 „ „	8 „
1 „ „	12–15 „ „	10 „

Es beziehen sich diese Preise auf wurzelächte gesunde Pflanzen, von welchen schon die kleinsten, 4 Zoll hohen, mehrere Blätter und Augen besitzen.

